

thoideae Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 1164. 1876,

P. P.

69. 神香草属——*Hyssopus* Linn.

Linn. Sp. Pl. ed. 1: 569. 1753.

多年生草本或半灌木，帚状。叶大都线形至长圆形，极全缘，边缘内卷或不内卷，中肋在下面显著；苞叶与茎叶同形，但变小。轮伞花序 2 至多花，大多偏于一侧，腋生，多数组成顶生伸长的穗状花序，位于下部者远离，位于上部者密集，具梗或近于无梗；苞片及小苞片细小；花梗明显。花萼管状，管状钟形，或近钟形，常具色泽，明显 15 脉，齿间凹陷由于二脉连接而呈小瘤状突起，外面被毛及腺点，萼齿 5，等大。花冠蓝色、紫色或偶有白色，外面被毛及腺点，内面无毛，冠筒几不伸出萼或明显超出萼，冠檐二唇形，上唇几扁平，先端微凹或 2 浅裂，有时近于全缘，下唇开张，3 裂，中裂片最大，先端截或凹陷，宽于或狭于二侧裂片。雄蕊 4，大多伸出，前对稍长，花丝无毛，花药卵圆形，2 室，室叉开。花柱先端相等 2 浅裂。花盘杯状，平顶。小坚果长圆形或长圆状卵形，先端被毛或具腺或无毛。

约 15 种，分布自亚洲中部，经西亚至南欧及北非，此外有 1 种见于苏联伏尔加及顿河流域。我国新疆产 2 种 1 变种，另有 1 种为引种栽培。

据报道本属植物主要作为药用，亦是蜜源及芳香油植物，芳香油主要用作甜酒香料，又可作观赏植物而栽培。

分 种 检 索 表

1. 叶及苞片线形，大多长于节间，具明显长约 2 毫米的锥状尖头；萼齿具锥状尖头；小坚果顶端具腺点…………… 2. 硬尖神香草 *H. cuspidatus* Boriss.
1. 叶、苞片及萼齿先端均无锥状尖头。
 2. 花冠长约 1 厘米，冠筒几不伸出花萼；花萼长约 7.5 毫米；小坚果无毛；叶长 1—4 厘米，宽 2—7 毫米…………… 1. 神香草 *H. officinalis* Linn.
 2. 花冠长 1.3 厘米，冠筒明显伸出花萼；花萼长约 6 毫米；小坚果顶端被微柔毛；叶长 1—2 厘米，宽 1—2 毫米…………… 3. 宽唇神香草 *H. latilabiatu*s C. Y. Wu et H. W. Li

系 1. 神香草系——Ser. Officinales Boriss. in Fl. URSS 21: 450. 1954.

花萼长 8—10 毫米；花冠筒短，不超出花萼。