

0.7—0.8 毫米,宽 0.5—0.7 毫米。(标本未见,摘自原描写)

产黑龙江、吉林、辽宁;生于砾石草地,沙质谷地。苏联远东地区也有。模式标本采自苏联。

2. 短节百里香

Thymus mandschuricus Ronn. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **29**: 96. 1931; Kitagawa, Linaem. Fl. Mansh. 388. 1939.

植株近直立。花枝基部近木质,高可达 30 厘米,粗 1.5—2 毫米,分枝,密被平展的硬毛,毛长 0.5—1 毫米,节间多数,短,长 9—11 毫米。叶宽菱状椭圆形或椭圆形,在最下部较小,连柄长 8—12 毫米,宽 3—7 毫米,两面密被疏柔毛及明显腺点,中脉在下面突起,侧脉 3—5 对,稍明显;叶腋中常常长出具多数小叶的叶簇,小叶同形,长 2.5—4 毫米,宽 1—2.5 毫米。花序伸长成穗状,最长可达 5 厘米,具有大苞叶;花梗长 2—4 毫米,密被平展的疏柔毛。花萼长约 5 毫米,结果时达 6 毫米,具粗脉及腺点,萼筒长 2.5 毫米,上唇宽,具 3 短齿,齿尖三角形,长约 1 毫米,被缘毛。花冠玫瑰红色,外被疏柔毛,长 8 毫米,冠筒狭漏斗形,长约 5 毫米,上唇宽,微凹,下唇近伸长。(标本不全,参照原描写)

产黑龙江东南部。模式标本采自黑龙江。

3. 异株百里香 图版 58

Thymus marschallianus Willd. Sp. Pl. **3**: 1141. 1800; Klok. in Fl. URSS **21**: 511. 1954.

半灌木。茎短,近直立或斜上升,多分枝;不育枝不发达,多从茎顶或侧边长出,通常比花枝短而少,被短柔毛;花枝发达,高可达 30 厘米,近直立或上升,稀有弯曲,在较大的枝上常有分枝长出,具花部分被开展或向下的长柔毛,不具花部分通常被短柔毛;在叶腋中常长出具有丛生小叶的短枝。叶长圆状椭圆形或线状长圆形,长 1—2.8 厘米,宽 1—6.5 毫米,先端锐尖或钝,基部渐狭成短柄,全缘或偶有在边缘上部具 1—2 对不明显的小齿,扁平或稍背卷,绿色,两面无毛或稀被微柔毛,中脉及 2 对侧脉在上面不明显,但在下面微突起,纤细,腺点小而在下面明显。轮伞花序沿着花枝的上部排成间断或近连续的穗状花序。两性花、雌花异株,两性花发育正常,雌性花较

图版 58: 异株百里香 **Thymus marschallianus** Willd., 1. 两性花植株; 2. 雌花植株; 3. 叶背面一部分; 4. 两性花,侧面观; 5. 两性花的花萼纵剖,内面观; 6. 两性花的花冠纵剖,内面观,兼示雄蕊; 7. 两性花的雌蕊; 8. 雌花,侧面观; 9. 雌花的花萼纵剖,内面观; 10. 雌花的花冠纵剖,内面观; 11. 小坚果,腹面观。(曾孝濂绘)