

式标本采自阿尔泰山。

8. 百里香(甘肃临夏) 地薑(甘肃镇原), 千里香(甘肃天水, 山西武宁), 地椒叶(陕西靖边、安塞、子洲), 地角花(河北) 图版 59:8—13

Thymus mongolicus Ronn. in Act. Hort. Gothob. 9:99. 1934 (non Klok. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS 16:310. 1954)——*Thymus serpyllum* Linn. var. *mongolicus* Ronn. in Notizbl. Bot. Gart. Berl. 10:890. 1930; et in Journ. Arn. Arb. 14:31. 1933.

半灌木。茎多数, 匍匐或上升; 不育枝从茎的末端或基部生出, 匍匐或上升, 被短柔毛; 花枝高(1.5)2—10厘米, 在花序下密被向下曲或稍平展的疏柔毛, 下部毛变短而疏, 具2—4叶对, 基部有脱落的先出叶。叶为卵圆形, 长4—10毫米, 宽2—4.5毫米, 先端钝或稍锐尖, 基部楔形或渐狭, 全缘或稀有1—2对小锯齿, 两面无毛, 侧脉2—3对, 在下面微突起, 腺点多少有些明显, 叶柄明显, 靠下部的叶柄长约为叶片1/2, 在上部则较短; 苞叶与叶同形, 边缘在下部1/3具缘毛。花序头状, 多花或少花, 花具短梗。花萼管状钟形或狭钟形, 长4—4.5毫米, 下部被疏柔毛, 上部近无毛, 下唇较上唇长或与上唇近相等, 上唇齿短, 齿不超过上唇全长1/3, 三角形, 具缘毛或无毛。花冠紫红、紫或淡紫、粉红色, 长6.5—8毫米, 被疏短柔毛, 冠筒伸长, 长4—5毫米, 向上稍增大。小坚果近圆形或卵圆形, 压扁状, 光滑。花期7—8月。

产甘肃, 陕西, 青海, 山西, 河北, 内蒙古; 生于多石山地、斜坡、山谷、山沟、路旁及杂草丛中, 海拔1100—3600米。等模式标本采自甘肃洮河盆地及青海。

9. 阿尔泰百里香

Thymus altaicus Klok. et Shost. in Journ. Inst. Bot. Acad. Sci. Ukraine 10(18):159. 1936; Klok. in Fl. URSS 21:540. 1954——*Thymus altaicus* Serg. in Animadv. Syst. Herb. Univ. Tomsk. 6—7:2. 1936.

半灌木。茎匍匐或上升, 末端具不育枝或花枝; 不育枝多为侧生或基生, 上升或匍匐, 被短柔毛; 花枝在基部上升, 大多数长4—8厘米, 在花序以下被向下的微柔毛或短柔毛, 至基部近无毛, 具2—4个节间。叶长圆状椭圆形或卵圆形, 稀有倒卵圆形, 长5—10毫米, 宽1—3毫米, 先端钝或锐尖, 基部渐狭成短柄, 全缘, 在基部常具

图版 59: 1—7. 地椒(原变种) *Thymus quinquecostatus* Célak. var. *quinquecostatus*, 1. 植株; 2. 叶, 背面观; 3. 花, 侧面观; 4. 花萼纵剖, 内面观; 5. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 6. 雌蕊; 7. 小坚果, 背面观。 8—13. 百里香 *Thymus mongolicus* Ronn., 8. 植株; 9. 叶, 背面观; 10. 花, 侧面观; 11. 花萼纵剖, 内面观; 12. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 13. 雌蕊。(曾孝濂绘)

