

有少数的长缘毛,两面无毛,侧脉 2—3 对,较粗壮,在下面突起,腺点明显或不明显,先出叶常常在枝的基部密集,脱落。花序头状,有时在花序下具有 1—2 个不发育的轮伞花序;花梗长 1—4 毫米,密被短柔毛。花萼钟形,长 3.5—4.5 毫米,下部被疏柔毛,上部无毛,上唇齿近三角形至披针形,无缘毛或被短的硬毛。花冠红紫色,长 5.5—6.5 毫米,外被短柔毛。花期 7—8 月。

产新疆北部(阿尔泰山);生于沟边、草地及石砾地上,海拔 1100—1400 米。苏联也有。模式标本采自阿尔泰山。

新疆阿尔泰山区所产的植物与苏联所产的不同在于花较大,花萼上唇齿无缘毛。

10. 显脉百里香

Thymus nervulosus Klok. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS 16:302. 1954; in Fl. URSS 21:522. 1954.

半灌木。茎纤细,多数丛生,上升;不育枝从茎的末端或基部生出,甚至从根茎生出,长可达 30 厘米,纤细,向上开展或稀有匍匐,被有向下弯曲的疏柔毛;花枝少数,从茎或直接从根茎生出,纤细,长在 5 毫米以上,上升或直立,花序被向下弯曲的疏柔毛,毛在花枝下部较短。叶具短柄,椭圆形,长圆状卵圆形或长圆形,在下部的叶常为宽椭圆形或卵圆形,长 0.5—1.6 厘米,宽 1.5—5 毫米,先端钝或锐尖,基部楔形或渐狭,边缘全缘或具 1—2 对小锯齿,在边缘下 1/3 及叶柄被有少数的长缘毛,两面无毛,侧脉 2—3 对,在下面突起,在上面明显或不明显。花序头状,有时具有不发育远离的轮伞花序。花萼管状钟形,长 4—5 毫米,下部被疏柔毛,上部略被毛但在齿下方无毛,具有明显的脉,上唇齿披针形,渐尖,边缘具缘毛。花冠长 6—8 毫米,内外被短柔毛,冠筒较长,伸出花萼。花期 7 月。

产黑龙江西南部;生于草原或山坡上。苏联远东地区也有。模式标本采自苏联。

11. 地椒(广群芳谱引本草)

Thymus quinquecostatus Cêlak. in Österr. Bot. Zeitschr. 39:263. 1889; Ronn. in Act. Hort. Gothob. 9:99. 1934; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 389. 1939.

11a. 地椒(原变种) 图版 59: 1—7

var. **quinquecostatus**

半灌木。茎斜上升或近水平伸展;不育枝从茎基部或直接从根茎长出,通常比花枝少,疏被向下弯曲的疏柔毛;花枝多数,彼此靠近,高 3—15 厘米,从茎上或茎的基部长出,直立或上升,具有多数节间,节间最多可达 15 个,通常比叶短,稀有与之相等或比叶长,在基部的先出叶通常脱落,花序以下密被向下弯曲的疏柔毛,毛在花枝下