

部较短而变疏。叶长圆状椭圆形或长圆状披针形,稀有卵圆形或卵状披针形,长7—13毫米,宽1.5—3(4.5)毫米,稀有长达2厘米,宽8毫米,先端钝或锐尖,基部渐狭成短柄,全缘,边外卷,沿边缘下1/2处或仅在基部具长缘毛,近革质,两面无毛,侧脉2(3)对,粗,在下面突起上面明显,腺点小且多而密,明显;苞叶同形,边缘在下部1/2被长缘毛。花序头状或稍伸长成长圆状的头状花序;花梗长达4毫米,密被向下弯曲的短柔毛。花萼管状钟形,长5—6毫米,上面无毛,下面被平展的疏柔毛,上唇稍长或近相等于下唇,上唇的齿披针形,近等于全唇1/2长或稍短,被缘毛或近无缘毛。花冠长6.5—7毫米,冠筒比花萼短。花期8月。

产山东,辽宁,河北,河南,山西;生于山坡,海边低丘上,海拔600—900米。朝鲜,日本也有。模式标本采自山东。

11b. 展毛变种

var. **przewalskii** (Kom.) Ronn. in Act. Hort. Göthob. 9:100. 1934——*Thymus serpyllum* Linn. var. *przewalskii* Kom. in Act. Hort. Petrop. 25:377. 1907——*Thymus przewalskii* Nakai in Tokyo Bot. Mag. 35:202. 1921, excl. specim., quoad syn.——*Thymus przewalskii* Kom. ex Klok. in Fl. URSS 21:502. 1954.

这一变种与原变种不同在于叶无毛,宽卵状披针形,长10—12毫米,宽4—5毫米,具7—9脉;花序轴密被十分平展的毛,毛短于花序轴直径。

产黑龙江,吉林,辽宁,内蒙古,河北,河南,山西,陕西,甘肃;生于山坡石砾地或草地,河岸沙地,沙滩,石隙,石山,石墙上,海拔600—2000(3500)米。苏联远东地区,朝鲜也有。模式标本采自黑龙江兴凯湖畔。

11c. 亚洲变种

var. **asiaticus** (Kitagawa) C. Y. Wu et Y. C. Huang, comb. nov.——*Thymus serpyllum* Linn. var. *asiaticus* Kitagawa in Rep. First. Sci. Exped. Manch. sect. 4, 4:44 (nomen.), 99 (descr.). 1931——*Thymus asiaticus* Kitagawa in l. c. 92. 1936, pro syn.; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 388. 1939.

这一变种与原变种不同在于叶披针形或线状披针形,宽通常不超过2毫米。

产内蒙古;生于干山坡,海拔约600米。模式标本采自内蒙古。

亚族4. 薄荷亚族——MENTHINAE Briq.

Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 3a:208, 316.

1897; Volkova in Fl. URSS 21:591. 1954——*Menthoideae* Benth.