

var. **cavaleriei** (Lévl.) C. Y. Wu et H. W. Li, 云南植物志 **1**: 708 1976——*Lycopus cavaleriei* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov **8**: 423 1910——*Lycopus europaeus* Linn. var. *sinensis* Lévl. in l. c. **8**: 423 1910——*Lycopus coreanus* Lévl. var. *ramosissimus* auct. non Nakai: Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 86 1929, p. p.——*Lycopus europaeus* auct. non Linn.: Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 157. 1915.

这一变种与原变种不同在于叶较大，比节间长，长圆状倒披针形至长圆状卵圆形，基部楔状极狭长下延，边缘具不规则的圆齿状牙齿。

产贵州，云南，四川；生于水塘、沟渠及水田边，海拔 850—1600 米。模式标本采自贵州。

亚族 5. 紫苏亚族——PERILLINEAE Briq.

Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam **4**, **3a**: 208, 325. 1897; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ **2**: 70. 1929; Gorshk. in Fl. URSS **21**: 630. 1954——*Menthoideae* Benth. Labiat. Gen. et Sp. 152. 1833, p. p.——*Satureieae* subtrib *Menthoideae* Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. **2**: 1164. 1876, p. p.

74. 紫苏属——*Perilla* Linn.

Linn. Sp. Pl. 597. 1753

一年生草本，有香味。茎四棱形，具槽。叶绿色或常带紫色或紫黑色，具齿。轮伞花序 2 花，组成顶生和腋生、偏向于一侧的总状花序，每花有苞片一枚；苞片大，宽卵圆形或近圆形。花小，具梗。花萼钟状，10 脉，具 5 齿，直立，结果时增大，平伸或下垂，基部一边肿胀，二唇形，上唇宽大，3 齿，中齿较小，下唇 2 齿，齿披针形，内面喉部有疏柔毛环。花冠白色至紫红色，冠筒短，喉部斜钟形，冠檐近二唇形，上唇微缺，下唇 3 裂，侧裂片与上唇相近似，中裂片较大，常具圆齿。雄蕊 4，近相等或前对稍长，直伸而分离，药室 2，由小药隔所隔开，平行，其后略又开或极叉开。花盘环状，前面呈指状膨大。花柱不伸出，先端 2 浅裂，裂片钻形，近相等。小坚果近球形，有网纹。

1 种，3 变种，产亚洲东部。

1. 紫苏（通称） 苏、桂荏（尔雅），荏、白苏（名医别录，植物名实图考），荏子（银子）