

10. 叶边缘为锐尖的疏齿;苞片针状或线状披针形,与花梗等长或略超过;花萼长约2毫米;花冠为花萼长的2倍多……………10. 小鱼仙草 *M. dianthera* (Buch.-Ham.) Maxim.

10. 叶具圆齿或圆齿状锯齿。

11. 叶倒卵形或菱形,先端钝;苞片卵状披针形至披针形,其长远超过花梗;花冠长微超过花萼……………11. 长苞荠苎 *M. longibracteata* (C. Y. Wu) C. Y. Wu et H. W. Li

11. 叶卵形或卵状披针形,先端钝或锐尖;苞片披针形,与花梗等长;花萼长不及2毫米,花冠长近为花萼之3倍……………12. 台湾荠苎 *M. formosana* Maxim.

组1. 石荠苎组——Sect. *Orthodon* C. Y. Wu et Hsuan in Act. Phytotax. Sin. **10** (3): 230. 1965.

萼5齿近相等;苞片较宽,卵状披针形至圆形或圆倒卵形,覆瓦状排列或稀疏排列。

1. 石香薷(湖南、江西,植物名实图考) 香薷草、细叶香薷(湖南),蓼刀竹(江西寻乌),小香薷(江西景德镇、贵州梵净山),小叶香薷(江西德兴),香草(江西宜黄),满山香(江西吉安),小茴香(江西定南),青香薷(江西),香薷(江西彭泽、福建福州、广东连县、广西、四川叙永),种芥、凉芥(广西桂林),沙药、香茹草(广西临桂),细叶香薷、土香薷、土香草、石艾、土荆芥、七星剑(广西),还魂草(广东罗浮山),细叶七星剑、野香薷(广东),辣辣草、土黄连(贵州正安) 图版 63: 1—8

Mosla chinensis Maxim. in Mém. Biol. Acad. Sci. St. Pétersb. **11**: 805. 1883; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 280. 1890; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**: 162. 1913; et in ibid. **6**: 155. 1915; Doan in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine **4**: 985. 1936; H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12**(2): 211. 1974——*Orthodon chinensis* (Maxim.) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 75. 1929——*Mosla fordii* Maxim. in Mém. Biol. Acad. Sci. St. Petersb. **12**: 525. 1886; et in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. **31**: 89. 1887——*Orthodon fordii* (Maxim.) Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**: 39. 1934; et in Beih. Bot. Centralbl. **56B** (3): 458. 1937——*Calamintha clipeata* Vaniot in Bull. Acad. Internat. Géogr. Bot. **14**: 184. 1904.

直立草本。茎高9—40厘米,纤细,自基部多分枝,或植株矮小不分枝,被白色疏柔毛。叶线状长圆形至线状披针形,长1.3—2.8(3.3)厘米,宽2—4(7)毫米,先端渐尖或急尖,基部渐狭或楔形,边缘具疏而不明显的浅锯齿,上面榄绿色,下面较淡,两面均被疏短柔毛及棕色凹陷腺点;叶柄长3—5毫米,被疏短柔毛。总状花序头状,长1—3厘米;苞片覆瓦状排列,偶见稀疏排列,圆倒卵形,长4—7毫米,宽3—5毫米,先端短尾尖,全缘,两面被疏柔毛,下面具凹陷腺点,边缘具睫毛,5脉,自基部掌状生

出;花梗短,被疏短柔毛。花萼钟形,长约3毫米,宽约1.6毫米,外面被白色绵毛及腺体,内面在喉部以上被白色绵毛,下部无毛,萼齿5,钻形,长约为花萼长之2/3,果时花萼增大。花冠紫红、淡红至白色,长约5毫米,略伸出苞片,外面被微柔毛,内面在下唇之下方冠筒上略被微柔毛,余部无毛。雄蕊及雌蕊内藏。花盘前方呈指状膨大。小坚果球形,直径约1.2毫米,灰褐色,具深雕纹,无毛。花期6—9月,果期7—11月。

产山东,江苏,浙江,安徽,江西,湖南,湖北,贵州,四川,广西,广东,福建及台湾:生于草坡或林下,海拔至1400米。越南北部也有。模式标本采自福建福州。

民间用全草入药,治中暑发热、感冒恶寒、胃痛呕吐、急性肠胃炎、痢疾、跌打瘀痛、下肢水肿、颜面浮肿,消化不良、皮肤湿疹搔痒、多发性疖肿,此外亦为治毒蛇咬伤要药。

2. 杭州石荠苎

Mosla hangchowensis Matsuda in Bot. Mag. Tokyo **26**: 344. 1912; H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12** (2): 212. 1974—*Orthodon hangchowensis* (Matsuda) C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **10** (3): 230. 1965; Sun ex C. H. Hu in *ibid.* **11** (1): 46. 1965.

2a. 杭州石荠苎(原变种) 图版 63: 9—10

var. *hangchowensis*

一年生草本。茎高50—60厘米,多分枝,分枝纤弱,茎、枝均四棱形,被短柔毛及棕色腺体,有时具混生的平展疏柔毛。叶披针形,长1.5—4.2厘米,宽0.5—1.3厘米,先端急尖,基部宽楔形,边缘具疏锯齿,纸质,上面榄绿色,下面灰白色,两面均被短柔毛及满布的棕色凹陷腺点;叶柄长0.5—1.4厘米,腹凹背凸,被短柔毛及棕色凹陷腺点。总状花序顶生于主茎及分枝上,长1—4厘米,密花或有时疏花;苞片大,宽卵形或近圆形,长5—6毫米,宽4—5毫米,先端急尖或尾尖,下面具凹陷的腺点,边缘具睫毛,绿色或紫色;花梗短,被短柔毛。花萼钟形,长约3.5毫米,宽约2.5毫米,外被疏柔毛,内面无毛,萼齿5,披针形,长约为花萼长3/4,后齿略长。花冠紫色,为花萼长之3倍,外面被短柔毛,内面在下唇之下方冠筒上略被短柔毛,冠檐二唇形,上唇微

图版 63: 1—8. 石香薷 *Mosla chinensis* Maxim., 1. 植株上部, 示花序; 2. 叶上面一部分; 3. 苞片, 外面观; 4. 花, 侧面观; 5. 花萼纵剖, 内面观; 6. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 7. 雌蕊; 8. 小坚果, 背面观。 9—10. 杭州石荠苎(原变种) *Mosla hangchowensis* Matsum. var. *hangchowensis*, 9. 植株上部, 示花序; 10. 叶上面一部分。(曾孝濂绘)

