

毛环。不育雄蕊的药室明显。小坚果比萼筒短,近球形,基部略锐尖,具疏网纹,基部小窝明显,同色。

在此次编写工作中,未见到我国产的标本中有符合原描写特征的,据 Kudo, Maxim., Franch. et Savat. 及 Hemsl. 记载,本种产辽宁,吉林,江苏(Poli 采),安徽。日本有分布。模式标本采自日本。由于未见到上述作者所依据的标本,今按原描写摘出,暂列于此。

8. 无叶芥兰

Mosla exfoliata (C. Y. Wu) C. Y. Wu et H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12**(2):213. 1974——*Orthodon exfoliatus* C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **10**(3):232. 1965.

一年生直立草本。茎高 20—35 厘米,紫红色,四棱形,具槽,具分枝,被灰色向下的短柔毛,常无叶。穗状花序极多数,即每一分枝即为一花序,长短不等,在 1—10 厘米之间;苞片卵状披针形,长 2.5—3.5 毫米,宽 1—1.5 毫米,为花梗长之 1.5—2 倍,先端锐尖或渐尖,基部渐狭,全缘,被缘毛,两面被灰色短柔毛。花萼钟形,长约 3.5 毫米,宽约 2.5 毫米,外面在萼筒上被长柔毛,余部被疏柔毛,二唇形,后 3 齿三角形,中齿稍短,前 2 齿披针形,略长,果时花萼稍增大,长达 5 毫米,宽 4 毫米。花冠紫色,微超出花萼,外面被微柔毛。小坚果未见。

产四川;生于开旷山地。模式标本采自四川巴县北碚缙云寺。

9. **小花芥兰** 荆芥、野香薷、细叶七星剑(广东),薄荷、酒饼叶(广西),瘕子草(贵州正安)

Mosla cavaleriei Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **9**:247. 1911; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:155. 1915; Doan in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine **4**:986. 1936; H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12**(2):213. 1974——*Orthodon cavaleriei* (Lévl.) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:81. 1929.

一年生草本。茎高 25—100 厘米,具分枝,具花的侧枝短,四棱形,具槽,被稀疏的具节长柔毛及混生的微柔毛。叶卵形或卵状披针形,长 2—5 厘米,宽 1—2.5 厘米,先端急尖,基部圆形至阔楔形,边缘具细锯齿,近基部全缘,纸质,上面榄绿色,被具节疏柔毛,下面较淡,除被具节疏柔毛外满布凹陷小腺点;叶柄纤细,长 1—2 厘米,腹凹背凸,被具节疏柔毛。总状花序小,顶生于主茎及侧枝上,长 2.5—4.5 厘米,果时长达 8 厘米;苞片极小,卵状披针形,与花梗近等长或略超出花梗,被疏柔毛;花梗细而短,长约 1 毫米,与序轴被具节小疏柔毛。花萼长约 1.2 毫米,宽约 1.2 毫米,外面被疏柔

毛,略二唇形,上唇3齿极小,三角形,下唇2齿稍长于上唇,披针形,果时花萼增大。花冠紫色或粉红色,长约2.5毫米,外被短柔毛,冠檐极短,上唇2圆裂,下唇较之略长,3裂,中裂片较长。雄蕊4,后对雌蕊能育,不超过上唇,前对雄蕊退化至极小。花柱先端2裂,微伸出花冠。小坚果灰褐色,球形,直径1.5毫米,具疏网纹,无毛。花期9—11月,果期10—12月。

产浙江,江西,湖北,四川,贵州,广西,广东及云南;生于疏林下,山坡草地上,海拔700—1600米。越南北部也有。模式标本采自贵州平坝。

全草入药,功效近石香薷。

10. 小鱼仙草(植物名实图考,滇南本草误作小仙草) 月味草(广东乐昌、惠阳、大埔),土荆芥(广东龙门),干汗草(广东军田),红花月味草、热痲草、假鱼香、土荆芥、姜芥、香花草(广东),野荆芥、假荆芥、土荆芥(广西),四方草(福建福安),石芥苧、痲子草、臭草、小本土荆芥(福建福州),大叶香薷、野香薷、野荆芥、霍乱草、痲子草(江西),山苏麻(贵州遵义),野荆芥、假荆芥、土荆芥(广西),疏花芥苧(种子植物名称) 图版64: 1—7

Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. **20**:457. 1875; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**:647. 1885; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:280. 1890; Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **4**, **3a**: 326, f. 98, E. 1897; Doan in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine **4**:986. 1936; H. Keng in Gard. Bull. Singapore **24**:120, f. 22, a-f. 1969; H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12**(2):213. 1974——*Lycopus dianthera* Buch.-Ham. in Roxb. Fl. Ind. **1**:145. 1820——*Orthodon diantherus* (Buch.-Ham.) Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:933. 1936——*Melissa nepalensis* Benth. in Wall. Pl. Asiat. Rar. **1**:66. 1830——*Cunila nepalensis* D. Don, Prodr. Fl. Nep. 107. 1825——*Hedeoma nepalensis* (D. Don) Benth. Labiat. Gen. et Sp. 366. 1834; et in DC. Prodr. **12**:244. 1848——*Mosla ocimoides* Buch.-Ham. ex Benth. in Wall. Pl. Asiat. Rar. **1**:66. 1830; Mukerj. in Bot. Sur. Ind. **14**:101. 1940——*Mosla remotiflora* Sun, 科学社生物所论文集, **7**:55. 1932; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**:89. 1934, pro syn.——*Orthodon punctatum* (Thunb.) Kudo var. *tetrantherus* Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**:89. 1934——*Mosla lanceolata* auct. non (Benth.) Maxim.: Merr. in Lingnan Sci. Journ. **11**:55. 1932.

一年生草本。茎高至1米,四棱形,具浅槽,近无毛,多分枝。叶卵状披针形或菱状披针形,有时卵形,长1.2—3.5厘米,宽0.5—1.8厘米,先端渐尖或急尖,基部渐狭,