

前者,果时花萼增大,长至6毫米,宽至5毫米。花冠淡粉红色或近白色,生于花序顶部者(因材料所限,仅见此朵花)其长微超过花萼,内面无毛环。小坚果黄褐色、近球形,直径约1.5毫米,具极疏的网纹。花期9—10月,果期10月以后。

产浙江,广西;生于山麓或河边,海拔约470米。模式标本采自浙江龙泉。

12. 台湾荠苎

Mosla formosana Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. **20**:459. 1875; Merr. Enum. Philip. Fl. Pl. **3**:414. 1925; H. Keng in Gard. Bull. Singapore **24**:122. f. 22 g-i. 1969; H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12**(2):214. 1974——*Orthodon formosanus* (Maxim.) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:79. 1929——*Mosla lysimachiiiflora* Hayata, Icon. Pl. Formos. **8**:104. 1919——*Orthodon lysimachiiiflorus* (Hayata) Masam. in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. **22**:232. 1932.

茎直立,具分枝,分枝直立平展,茎、枝均锐四棱形,具浅槽,近无毛。叶卵形或卵状披针形,长1.5—3厘米,宽0.7—1.5厘米,先端钝或锐尖,基部阔楔形,边缘具稍大的圆齿状锯齿,上面榄绿色,下面较淡,两面近无毛,下面满布凹陷腺点;叶柄长0.3—1.2厘米,腹凹背凸,腹面略被鳞秕状微柔毛。总状花序生于茎、枝及小枝顶上,长3—9厘米;苞片披针形,与花梗等长,先端锐尖,近无毛,下面满布腺点;花梗长1.5—2.5毫米,与序轴被极细的微柔毛。花萼长约2毫米,宽约2毫米,外面沿脉被小疏柔毛,余部散布微小腺毛,萼齿5,呈二唇形,上唇3齿,三角形,短而钝,中齿较短,下唇2齿,齿披针形,果时花萼增大,长约5毫米,宽3毫米。花冠长约5毫米,约为花萼长之3倍,外被微柔毛,内无毛环,冠檐二唇形,上唇直伸,先端微缺,下唇3裂,中裂片较大。雄蕊4,后对能育,药室2,叉开,前对退化,药室极不明显。花柱伸出花冠,先端近相等2浅裂,前裂片较长。小坚果黄褐色,卵球形,长约1毫米,具疏网纹,基生果脐小,点状,不明显。花后期及初果期10月。

产台湾。菲律宾也有分布。模式标本采自台湾。

族 10. 刺蕊草族——POGOSTEMONEAE Reichenb.

Reichenb. Nom. 104. 1841; Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **4**, **3a**:208, 326. 1897; Volkova in Fl. URSS **21**:634. 1954——*Menthoideae* Benth. Labiat. Gen. et Sp. 152. 1833, p. p. ——*Satureiceae* subtrib. *Elsholtzieae* Benth. in DC. Prodr. **12**:149. 1848——*Satureineae* subtrib. *Pogostemoneae* Benth. in Benth. et