

Hook. f. Gen. Pl. 2:1164. 1876——*Satureieae* subtrib. *Pogostemoninae* Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2:45 1929.

76. 米团花属 — *Leucosceptrum* Smith

Smith, Exot. Bot. 2:113, t. 116. 1805; Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 3a:214. 1895; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2:300. 1929, p. p.; Kitamura et Murata in Act. Phytotax. Geobot. 20:166. 1962, excl. syn. *Comanthosphace* — *Teucrium* Sect. *Leucosceptrum* Benth. Labiat. Gen. et Sp. 660. 1836.

灌木或小乔木,树皮光滑;枝条通常被浓密的绒毛。叶具柄,宽大,幼时两面密被灰白或淡黄浓密星状绒毛或丛卷毛,老时上面通常脱落至无毛或仅中脉被微柔毛,背面毛被仍然浓密。花两性,具短柄,成顶生稠密长圆柱形穗状花序;苞片近肾形,密覆瓦状,全缘或具齿,小苞片微小,线形,花萼钟形,外面密被绒毛,微弯,具15脉,萼齿5(—7),整齐,三角形,短小。花冠白、粉红至紫红,筒状,冠筒内藏或微外露,无毛环,冠檐二唇形,上唇顶端微凹,下唇3裂,中裂片较大。雄蕊4,前对较长,着生于冠筒中部,花丝细弱,中部以下密被微柔毛,花芽时内卷,开花时直伸出花冠1倍或以上,花药1室,肾形,横裂,基部着生。花柱细弱,先端近相等2浅裂,裂片钻形。花盘近环状,等大,具极浅的裂片。子房4裂,有半透明的小突起及粉囊状小突起。小坚果长圆状三棱形,顶端平截,果脐小,位于基部,胚小,有胚乳。

到目前为止,可能仅有1种,分布于不丹,尼泊尔,印度东北部,缅甸北部,老挝,越南及我国云南、四川。

分布于湖北(长阳)、贵州(独山)的 *Leucosceptrum sinense* Hemsl. (*Elsholtzia cavaleriei* Lévl. et Vaniot; *Leucosceptrum bodinieri* Lévl.), 从原描写看,叶远较小,狭长圆状披针形,具极短柄而近于无毛或仅背面具白绒毛,小坚果顶端尾状渐尖,基部粘合的性状,应归入钩子属 *Rostrinucula*, 按模式照片 2087 号 (Henry 7765, 采自湖北长阳)符合于采自湖南(永顺,钟补勤 1426),广西(兴安,兴安队 230)的标本,其花序纤长,下垂,花冠喉部及花丝基部有不规则毛环,均为显著的钩子属 *Rostrinucula* 的特征,已组合为长叶钩子 *Rostrinucula sinensis* (Hemsl.) C. Y. Wu。而分布于云南东北部的 *Leucosceptrum plectranthoides* (Lévl.) Marquand, 其原描写极不详确, Marquand 及 Rehder 均未重加描写,亦未说明归入本属理由,从原描写及 Rehder 所举的种的

特征看来,该种可能是钩子 *Rostrinucula dependens* (Rehd.) Kudo 的同物异名,因未见到原材料,暂存疑。

1. **米团花**(云南双江) 山蜂蜜(云南红河), 渍糖树(云南屏边), 羊巴巴(云南保山), 渍糖花、蜜蜂树花、明堂花(云南), 白杖木(中国植物科属检索表, 中国种子植物科属辞典) 图版: 65

Leucosceptrum canum Smith, Exot. Bot. **2**:113, t. 116. 1806; Wall. Cat. n. 2023. 1829, nom.; Benth. in Wall. Pl. Asiat. Rar. **1**:58. 1830; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**:699. 1885; Potting. & Prain in Rec. Bot. Surv. Ind. **1**:260. 1890; Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh **7**:63, 314. 1912; et in ibid. 371. 1913; Dunn in ibid. **6**:193. 1915; Lacaita in Journ. Linn. Soc. Bot. **43**:478. 1917; Marquand in ibid. **48**:219. 1929; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:301. 1929; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:912. 1936; Doan in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine **4**:1045. 1936; Mukerj. Lab. Ind. 214. 1940; C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1):3. 1959; Murata in Hara, Fl. E. Himalaya 278. 1966; Vautier in Candollea **17**:48. 1961; Kitamura et Murata in Act. Phytotax. Geobot. **20**:166. 1962; Murata in ibid. **24**:83. 1969——*Clerodendron leucosceptrum* D. Don. Prodr. Fl. Nepal. 103. 1825——*Teucrium macrostachyum* Wall. ex Benth., Labiat. Gen. et Sp. 664. 1836; et in DC. Prodr. **12**:574. 1848; Gamble, Ind. Timbers 302——*Colquhounia* sp. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. **15**:145. 1879——*Comanthosphace nepalensis* Kitamura et Murata in Act. Phytotax. Geobot. **15**:109. 1959; et in Kihara, Fauna et Fl. Nepal Himal. **1**:210, f. 51. 1959.

大灌木至小乔木,高 1.5—7 米,树皮灰黄色或褐棕色,光滑,片状脱落,新枝被灰白色至淡黄色浓密的绒毛,老枝淡棕色,被微柔毛或几无毛。叶柄长 1.5—3 厘米,有时达 4.5 厘米,被淡黄色浓密的簇生绒毛;叶片纸质或坚纸质,椭圆状披针形,长 10—23 厘米或以上,宽 5—9 厘米或以上,先端渐尖,基部楔形,边缘具浅锯齿或锯齿,有时几为圆齿,幼时两面密被灰白或淡黄色的星状绒毛及丛卷毛,老时上面通常脱落至无毛或仅中脉被微柔毛,背面被浓密灰白或淡黄色的星状绒毛及丛卷毛。花序为由轮伞花序排列成长 10—13 厘米或以上的顶生稠密圆柱状穗状花序;苞片大,近肾形,先端急尖,全缘或具不规则的齿,外被星状绒毛,果时脱落,小苞片微小,线形,长约 1

图版 65: **米团花** *Leucosceptrum canum* Smith, 1. 植株上部,示花序; 2. 叶背面毛被; 3. 苞片,内面观; 4. 花,侧面观; 5. 花冠上的毛被; 6. 花萼纵剖,内面观; 7. 花冠纵剖,内面观,兼示雄蕊; 8. 雌蕊。(曾孝濂绘)