


特征看来,该种可能是钩子 *Rostrinucula dependens* (Rehd.) Kudo 的同物异名,因未见到原材料,暂存疑。

1. **米团花**(云南双江) 山蜂蜜(云南红河),渍糖树(云南屏边),羊巴巴(云南保山),渍糖花、蜜蜂树花、明堂花(云南),白杖木(中国植物科属检索表,中国种子植物科属辞典) 图版: 65

Leucosceptrum canum Smith, Exot. Bot. **2**:113, t. 116. 1806; Wall. Cat. n. 2023. 1829, nom.; Benth. in Wall. Pl. Asiat. Rar. **1**:58. 1830; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**:699. 1885; Potting. & Prain in Rec. Bot. Surv. Ind. **1**:260. 1890; Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh **7**:63, 314. 1912; et in ibid. 371. 1913; Dunn in ibid. **6**:193. 1915; Lacaita in Journ. Linn. Soc. Bot. **43**:478. 1917; Marquand in ibid. **48**:219. 1929; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:301. 1929; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:912. 1936; Doan in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine **4**:1045. 1936; Mukerj. Lab. Ind. 214. 1940; C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1):3. 1959; Murata in Hara, Fl. E. Himalaya 278. 1966; Vautier in Candollea **17**:48. 1961; Kitamura et Murata in Act. Phytotax. Geobot. **20**:166. 1962; Murata in ibid. **24**:83. 1969——*Clerodendron leucosceptrum* D. Don. Prodr. Fl. Nepal. 103. 1825——*Teucrium macrostachyum* Wall. ex Benth., Labiat. Gen. et Sp. 664. 1836; et in DC. Prodr. **12**:574. 1848; Gamble, Ind. Timbers 302——*Colquhounia* sp. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. **15**:145. 1879——*Comanthosphace nepalensis* Kitamura et Murata in Act. Phytotax. Geobot. **15**:109. 1959; et in Kihara, Fauna et Fl. Nepal Himal. **1**:210, f. 51. 1959.

大灌木至小乔木,高 1.5—7 米,树皮灰黄色或褐棕色,光滑,片状脱落,新枝被灰白色至淡黄色浓密的绒毛,老枝淡棕色,被微柔毛或几无毛。叶柄长 1.5—3 厘米,有时达 4.5 厘米,被淡黄色浓密的簇生绒毛;叶片纸质或坚纸质,椭圆状披针形,长 10—23 厘米或以上,宽 5—9 厘米或以上,先端渐尖,基部楔形,边缘具浅锯齿或锯齿,有时几为圆齿,幼时两面密被灰白或淡黄色的星状绒毛及丛卷毛,老时上面通常脱落至无毛或仅中脉被微柔毛,背面被浓密灰白或淡黄色的星状绒毛及丛卷毛。花序为由轮伞花序排列成长 10—13 厘米或以上的顶生稠密圆柱状穗状花序;苞片大,近肾形,先端急尖,全缘或具不规则的齿,外被星状绒毛,果时脱落,小苞片微小,线形,长约 1

图版 65: **米团花** *Leucosceptrum canum* Smith, 1. 植株上部,示花序; 2. 叶背面毛被; 3. 苞片,内面观; 4. 花,侧面观; 5. 花冠上的毛被; 6. 花萼纵剖,内面观; 7. 花冠纵剖,内面观,兼示雄蕊; 8. 雌蕊。(曾孝濂绘)



毫米,外密被星状绒毛;花梗短,长约1毫米,密被星状绒毛。花萼钟形,长6—8毫米,外面被浓密的淡黄色簇生星状绒毛及粉囊状小突起,内面无毛而明显可见约15脉,萼齿5(—7),整齐,三角形,长1.5毫米或稍短。花冠白色或粉红至紫红,筒状,长8—9毫米,外面被簇生星状绒毛,冠筒内藏,冠檐二唇形,上唇顶端微凹,下唇3裂,中裂片较大。小坚果长圆状三棱形,顶端平截,背面平滑,腹面具稀疏的半透明小突起,果脐小,位于果的基部,胚小,倒卵形,长为小坚果 $2/5$,有胚乳。花期11月至翌年3月,果期3—5月。

产云南东南、中南、南部至西南部,四川西南部;生于干燥的开阔荒地、路边及谷地溪边、林缘、小乔木灌丛中及石灰岩上,海拔1000—1900米,沿河谷上升到2400—2600米。不丹,尼泊尔,印度东北部,缅甸,老挝,越南也有。模式标本采自印度东北部。

旱季开花,花期甚长,为一很好的蜜源植物。

77. 香薷属——*Elsholtzia* Willd.

Willd. in Bot. Mag. Roem. & Ust. IV. 9:3. 1790; Sp. Pl. 3:

59. 1800.

草本,半灌木或灌木。叶对生,卵形,长圆状披针形或线状披针形,边缘具锯齿、圆齿或钝齿,无柄或具柄。轮伞花序组成穗状或球状花序,密接或有时在下部间断,穗状花序有时疏散纤细,圆柱形或偏向一侧,有时成紧密的覆瓦状,有时组成圆锥花序;最下部苞叶常与茎叶同形,上部苞叶呈苞片状,披针形、卵形或扇形,有时连合,覆瓦状排列,有时极细小,较狭于花萼;花梗通常较短。花萼钟形,管形或圆柱形,萼齿5,近等长或前2齿较长,喉部无毛,果时花萼通常直立,或延长,或稍膨大。花冠小,白,淡黄,黄,淡紫,玫瑰红至玫瑰红紫色,外面常被毛及腺点,内面具毛环或无毛,冠筒等长或稍长于花萼,直立或微弯,均自基部向上渐扩展,冠檐二唇形,上唇直立,先端微缺或全缘,下唇开展,3裂,中裂片常较大,全缘或啮蚀状或微缺,侧裂片通常较小,全缘。雄蕊4,前对较长,极少前对不发育,通常伸出,上升,分离,花丝无毛,花药2室,室略叉开或极叉开,其后汇合。花盘前方呈指状膨大,其长度通常超过子房。花柱纤细,通常超出雄蕊,先端或短或深2裂,裂片钻形或近线形,通常近等长,极少其中一裂片甚长。子房无毛。小坚果卵珠形或长圆形,褐色,无毛或略被不明显细毛,具瘤状突起或光滑。

约40种,主产亚洲东部,1种延至欧洲及北美,3种产非洲(埃塞俄比亚)。我国