

腺点,侧脉 7—8 对,与中脉在上面微凹陷下面凸出;叶柄极短或近无。穗状花序于茎、枝上顶生,长 5—13 厘米,细长,由具短梗多花的轮伞花序所组成,单一,或有时基部具 2 小分枝而呈三叉状;苞片钻形,微小,早落;花梗极短,长 0.5 毫米,与序轴被灰色绒毛及腺点。花萼钟形,长约 1.2 毫米,外面密被灰色绒毛及腺点,内面仅在齿上被绒毛,余部无毛,萼齿 5,三角状钻形,长约 0.5 毫米,近相等。花冠白色,长约 4 毫米,外面被短柔毛及腺点,内面近冠筒基部有斜向白色髯毛毛环,冠筒基部宽约 1 毫米,向上渐扩大,至喉部宽达 1.8 毫米,冠檐二唇形,上唇直立,长约 0.5 毫米,先端微缺,下唇开展,3 裂,中裂片近圆形,长约 1 毫米,边缘啮蚀状,侧裂片近三角形,先端钝。雄蕊 4,前对较长,均伸出,花药卵圆形,2 室。花柱超出雄蕊之上,先端近相等 2 深裂,裂片线形。小坚果长圆形,长约 1 毫米,淡褐色。花期 10 月。

产云南,四川;生于山谷灌丛边或疏林下,海拔 1900—2400 米。模式标本采自云南宾川。

5. 毛萼香薷

Elsholtzia eriocalyx C. Y. Wu et S. C. Huang in Act. Phytotax. Sin. **12**(3): 338. 1974——*Elsholtzia fruticosa* (D. Don) Rehd. var. *paucidentata* Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **13**:356. 1939.

5a. 毛萼香薷(原变种) 图版 67: 11—12

var. *eriocalyx*

半灌木,高 1.5—2 米。小枝近圆柱形,干时褐紫色,具条纹,被灰卷曲疏柔毛。叶椭圆形或长圆形,长 4—12 厘米,宽 1.5—4.5 厘米,先端急尖,基部宽楔形至近圆形,边缘疏生圆齿状锯齿,上面榄绿色,被微柔毛或近无毛,下面灰绿色,被微柔毛及腺点,侧脉 4—5 对,与中脉在上面下陷下面明显隆起,细脉在下面清晰可见;叶柄长 1—3 毫米,上面略具沟,被小疏柔毛,下面圆形,被微柔毛。穗状花序于茎、枝上顶生,长 5—8 厘米,径约 1.5 厘米,由具 8—10 花的轮伞花序所组成;苞叶下部者多少

图版 67: 1—2. 光香薷 *Elsholtzia glabra* C. Y. Wu et S. C. Huang, 1. 植株上部; 2. 花冠纵剖,内面观。3—4. 白香薷 *Elsholtzia winitiana* Craib, 3. 叶; 4. 叶背面一部分。5—7. 野拔子 *Elsholtzia rugulosa* Hemsl., 5. 叶; 6. 叶背面一部分; 7. 叶上面一部分。8—10. 黄白香薷 *Elsholtzia ochroleuca* Dunn, 8. 叶; 9. 叶背面一部分, 10. 花。11—12. 毛萼香薷(原变种) *Elsholtzia eriocalyx* C. Y. Wu et S. C. Huang var. *eriocalyx*, 11. 叶; 12. 花,侧面观。13—14. 头花香薷 *Elsholtzia capitulifera* C. Y. Wu, 13. 植株上部,示花序; 14. 花,侧面观。(李锡畴绘)