

与叶同形,长稍超过轮伞花序,上部者呈苞片状,长圆状或卵圆状披针形,长4—7毫米,宽1—1.5毫米;花梗长约1毫米,与序轴密被绵毛状疏柔毛。花萼钟形,长约2毫米,外面密被绵毛状疏柔毛,间杂有淡黄色腺点,内面仅在齿上略被微柔毛,余部无毛,齿缘具小睫毛,萼齿5,披针形,等长。花冠黄白色,长约7毫米,外面被短柔毛及腺点,内面在冠筒中部以下有毛环,冠筒基部宽1毫米,向上渐宽,至喉部宽达2毫米,冠檐二唇形,上唇直立,先端微缺,下唇开展,3裂,中裂片圆形,全缘,侧裂片较小,半圆形。雄蕊4,前对较长,均伸出,花丝无毛,花药卵圆形,2室。花柱丝状,超出雄蕊,先端微弯,近相等2浅裂,裂片钻形。子房无毛。成熟小坚果未见。花期9—10月。

产云南西北部;生于草地湿润处或山坡上,海拔2700—3400米。模式标本采自云南丽江。

5b. 绒毛变种

var. **tomentosa** C. Y. Wu et S. C. Huang in Act. Phytotax. Sin. **12**(3):339. 1974.

这一变种与原变种不同在于叶一般较小而狭,下面密被白色毡状绒毛。

产四川西南部;生于松栎林下或灌丛边,海拔约3100米。模式标本采自四川木里。

6. 黄白香薷

Elsholtzia ochroleuca Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**:161. 1913; in ibid. **6**:148, 151. 1915; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **16**:16. 1935; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **13**:356. 1939——*Elsholtzia lampradena* Lévl. in Bull. Géogr. Bot. **25**:25. 1915; Cat. Pl. Yun-Nan 137. 1916——*Aphanochilus fruticosus* (D. Don) Kudo var. *ochroleuca* (Dunn) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:62. 1929

6a. 黄白香薷(原变种) 图版 67: 8—10

var. **ochroleuca**

直立灌木,高1—1.5米。老枝圆柱形,淡褐色,有纵向剥落的皮层,幼枝钝四棱形,具条纹,深褐色,密被灰色向上弯曲的柔毛。叶卵形至卵状椭圆形,长5—8厘米,宽2.5—4.3厘米,先端急尖,基部楔状下延,边缘在基部以上具圆齿,基部全缘,上面深绿色,下面淡绿色,两面沿中脉及侧脉上较密被余部极疏被灰色糙伏毛,两面密布淡黄色腺点,侧脉约4—6对,与中脉在上面下陷下面隆起,细脉在下面清晰可见;叶