

柄长 0.5—1.5 厘米,腹平背凸,密被灰色卷曲柔毛。穗状花序于茎、枝上顶生,长 5—10 厘米,花时径约 1 厘米,由具短梗的轮伞花序密集组成,位于下方的轮伞花序稍疏离,下部者靠近;苞叶除最下部 1—2 对叶状,其长度稍超过轮伞花序外,向上均细小,苞片状,钻状披针形;花梗长 0.5—1.5 毫米,与总梗、序轴均密被灰黄色绒毛。花萼钟形,长约 1.2 毫米,宽约 1 毫米,外面被黄白色绒毛,内面仅齿上被黄白色绒毛,余部无毛,萼齿 5,三角状钻形,长约 0.4 毫米,近相等。花冠淡黄白色,长约 3.2 毫米,外面稍被疏柔毛,间夹有淡黄色腺点,内面在冠筒中部以下有髯毛状毛环,冠筒长约 2.2 毫米,基部宽约 0.5 毫米,向上渐宽,至喉部宽达 1 毫米,冠檐二唇形,上唇直立,长约 1 毫米,先端微缺,下唇开展,3 裂,中裂片近圆形,长约 1 毫米,边缘具缺刻,侧裂片半圆形。雄蕊 4,前对较长,均伸出,花丝扁平,无毛,花药卵圆形,2 室。子房无毛。未成熟小坚果长圆形,长约 1 毫米,顶端圆形,腹部具稜,淡褐色,无毛。花期 8 月。

产云南东南部;生于灌木丛中,海拔 1600—2000 米。模式标本采自云南蒙自。

6b. 小叶变种

var. *parvifolia* C. Y. Wu et S. C. Huang in Act. Phytotax. Sin. **12**(3):339. 1974.

这一变种与原变种不同在于叶一般较小或极小,长 1.5—4 厘米,宽 0.8—2.3 厘米。

产四川西部,云南西北部;生于山坡阳处及水沟边,海拔 1940—2600 米。模式标本采自四川马尔康。

7. **木香薷**(东北植物检索表,河北承德) 柴荆芥(北京昌平),香荆芥、山菁(荆芥)(河北小五台山),荆芥(河北赞皇),臭荆芥(河北北部),野荆芥(河南洛阳) 图版 66: 9—10

Elsholtzia stauntoni Benth. Labiat. Gen. et Sp. 161. 1833; et in DC. Prodr. **12**:160. 1848; Hance in Journ Linn. Soc. Bot. **13**:85. 1871; Franch. Pl. David. 233. 1884; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:278. 1890; Jack in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. **18**:288. 1909; Skan in Curtis's Bot. Mag. **138**:pl. 8460. 1912; Mottet in Rev Hort. Paris **1914**:58, pl. I. f. 13. 1914; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:148, 151. 1915; Bean in Trees & Shrubs **1**:410. 1915; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Götthob. **9**:91. 1934, **13**:354. 1939; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 379. 1939——*Aphanochilus stauntoni* (Benth.) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:63.

1929.

直立半灌木,高 0.7—1.7 米。茎上部多分枝,小枝下部近圆柱形,上部钝四棱形,具槽及细条纹,带紫红色,被灰白色微柔毛。叶披针形至椭圆状披针形,长 8—12 厘米,宽 2.5—4 厘米,先端渐尖,基部渐狭至叶柄,边缘除基部及先端全缘外具锯齿状圆齿,上面绿色,除边缘及中脉被微柔毛外余部极无毛,下面白绿色,除中脉及侧脉略被微柔毛外余部无毛但密布细小腺点,侧脉 6—8 对,与中脉在上面明显凹陷下面明显隆起;叶柄长 4—6 毫米,腹凹背凸,常带紫色,被微柔毛。穗状花序伸长,长 3—12 厘米,生于茎枝及侧生小花枝顶上,位于茎枝上者较长,因而在茎或枝上俨如圆锥状,由具 5—10 花、近偏向于一侧的轮伞花序所组成;苞叶除花序最下方一对叶状且十分超出轮伞花序外,均呈苞片状,披针形或线状披针形,长 2—3 毫米,常染紫色;花梗长 0.5 毫米,与总梗、序轴被灰白微柔毛。花萼管状钟形,长约 2 毫米,宽约 1 毫米,外面密被灰白色绒毛,内面仅在萼齿上被灰白色绒毛,余部无毛,萼齿 5,卵状披针形,长约 0.5 毫米,近等大;果时花萼伸长,明显管状,长达 4 毫米,宽 1.5 毫米。花冠玫瑰红紫色,长约 9 毫米,外面被白色柔毛及稀疏腺点,内面约在冠筒中部花丝基部有斜向间断髯毛毛环,冠筒长约 6 毫米,基部宽约 1 毫米,向上渐宽,至喉部宽达 2.5 毫米,冠檐二唇形,上唇直立,长约 2 毫米,先端微缺,下唇开展,3 裂,中裂片近圆形,长约 3 毫米,侧裂片近卵圆,先端圆,较中裂片稍短。雄蕊 4,前对较长,十分伸出,花丝丝状,无毛,花药卵圆形,2 室。花柱与雄蕊等长或略超出,先端近相等 2 深裂,裂片线形。子房无毛。小坚果椭圆形,光滑。花、果期 7—10 月。

产河北,山西,河南,陕西,甘肃;生于谷地溪边或河川沿岸,草坡及石山上,海拔 700—1600 米。模式标本采自北京以北地区。

8. 白香薷 香薷(云南耿马),麻永牙(云南傣语),四方蒿(云南芒市) 图版 67: 3—4

Elsholtzia winitiana Craib in Kew Bull. Misc. Inf. 1918:368. 1918; Doan in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 4:980, f. 102, 1—5. 1936.

直立草本,高 1—1.7 米。枝钝四棱形,具浅槽及细条纹,密被白色卷曲长柔毛。叶长圆状披针形,长 4—10 厘米,宽 1.5—3.5 厘米,先端渐尖,基部楔形,边缘具圆锯齿,薄纸质,上面灰绿色,极密被灰色柔毛,下面灰白色,极密被灰色柔毛及腺点,侧脉 6—7 对,与中脉在两面微隆起;叶柄长 0.7—1.5 厘米,腹平背凸,极密被灰色柔毛。穗状花序顶生及腋生,长 3—9 厘米,开花时径约 4 毫米,花后径不过 5—6 毫米,着生于茎、枝及小枝顶上,多数密集排列成圆锥花序;苞叶位于穗状花序下部者长圆状倒

