

Agr. Taihoku Univ. **2**: 69. 1929; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**: 92. 1934; Symb. Sin. **7**: 936. 1936; Hao in Engler, Bot. Jahrb. **68**: 635. 1938——*Platyelasma calycocarpum* (Diels) Kitagawa in Rep. First Sci. Exped. Manch. IV, **2**: 25. 1933.

这一变种与原变种不同在于植株矮小, 扭曲, 红色, 基部多分枝, 枝平出上升; 叶较小而狭, 但非披针形。

产甘肃, 青海, 四川西北部, 山西, 云南西北部; 生于山坡荒地, 田边, 海拔 2200—3500 米。模式标本采自四川。

19c. 细穗变种

var., **ianthina** (Maxim. ex Kanitz) C. Y. Wu et S. C. Huang in Act. Phytotax Sin. **12** (3): 344. 1974——*Dysophylla ianthina* Maxim. ex Kanitz, A. Novenyt. Gyijtesek Gróf. Széchenyi 46. 1877—80——*Elsholtzia ianthina* (Maxim. ex Kanitz) Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 152. 1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 68. 1929; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**: 92. 1934——*Platyelasma manshurica* Kitagawa in Rep. First Sci. Exped. Manch. IV, **2**: 26, t. 7A-I. 1935——*Elsholtzia manshurica* (Kitagawa) Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 379. 1939.

这一变种与原变种不同在于植株高大; 叶较狭, 披针形; 花序一般较细长。

产辽宁, 河北, 山西, 陕西, 甘肃, 青海及四川北部; 生于山坡及荒地, 海拔 1000—3000 米。模式标本采自甘肃。

组 2. 连苞组——Sect. *Cyclostegia* Benth. Labiat. Gen. et Sp. 167. 1832; in DC. Prodr. **12**: 162. 1848; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. **2**: 1181. 1876——*Cyclostegia* Benth. in Bot. Reg. sub. 1282. 1830.

穗状花紧密, 覆瓦状排列; 苞叶合生, 膜质, 具脉, 覆瓦状排列, 浅杯状, 边缘具缘毛; 花药卵圆形, 药室汇合。

20. 球穗香薷 臭苏麻(四川峨眉), 野苏麻(四川凉山)

Elsholtzia strobilifera Benth. Labiat. Gen. et Sp. 163. 1833; in DC. Prodr. **12**: 162. 1848; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 645. 1885; Smith et Cave in Rec. Bot. Surv. Ind. **4**: 232. 1911; Marquand in Journ. Linn. Soc. Bot. **48**: 216. 1929; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **13**: 358. 1939——*Cyclostegia strobilifera* Benth. in Wall. Cat. n. 1562. 1828, nom. nud.; in Wall. Pl. Asiat. Rar. **1**: 30. 1830, descr., excl. syn.