

卵形或长圆形,长 3.5—5 毫米,宽 2—3 毫米,全缘或具退化的钝齿,两面均被白色柔毛,茎枝上叶披针形或倒披针形,长 0.8—2.5 厘米,宽 0.4—0.7 厘米,先端钝,基部渐狭,边缘在上部具钝锯齿,近革质,上面绿色下面淡绿色,或两面常染紫红色,两面无毛,极少被稀疏的疏柔毛,下面满布凹陷腺点,侧脉约 4 对,与中脉在上面凹陷下面隆起。穗状花序单生于茎及枝顶端,长 2—3.5 厘米;苞片覆瓦状排列,连合成杯状,宽 6—8 毫米,先端具小突尖头,外面被柔毛及腺点,脉纹常带紫红色,内面无毛,边缘具缘毛。花萼管状,长 3 毫米,外面被白色长柔毛及腺点,内面仅萼齿边缘具白色缘毛,萼齿披针形,近等大,长约 1 毫米。花冠玫瑰红紫色,长约 9 毫米,外面被长柔毛及稀疏的腺点,冠筒下弯,基部宽 0.5 毫米,向上渐宽,至喉部宽达 2 毫米,冠檐二唇形,上唇直立,先端微缺,下唇稍开展,3 裂,中裂片较长,全缘。雄蕊 4,前对较长,均伸出,花药卵圆形,2 室。花柱超出雄蕊,先端微弯,近相等 2 裂,裂片线状钻形。小坚果长圆形,长约 1.1 毫米,棕黑色。花期 9—11 月,果期 12 月至翌年 2 月。

产云南,贵州西部;生于松林下或山坡草地上,海拔 1200—3000 米。模式标本采自云南昆明。

植株含芳香油,新鲜植株得油率 0.25—0.3%,油无色。全草入药,治外感风寒、感冒发热、头痛身痛、咽喉痛、虚火牙痛、消化不良、腹泻、目痛、急性结膜炎、尿闭及肝炎等症。嫩尖亦可当茶饮用,有清热解毒之效。

23. 淡黄香薷

Elsholtzia luteola Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh **5**: 232. 1912; in *ibid.* **7**: 47, 313, 357. 1912—13; Dunn in *ibid.* **6**: 152. 1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 67. 1929; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **13**: 355, 361. 1939.

23a. 淡黄香薷(原变种) 图版 70: 1—2

var. *luteola*

一年生草本,高 8—40 厘米,须根密集。茎直立,简单或多分枝,淡黄色,近圆柱形,被疏柔毛。叶披针形,长 1—3.5 厘米,宽 0.3—1 厘米,先端急尖,基部楔形,边缘具疏锯齿,草质,上面绿色,近无毛,下面淡绿色,被疏柔毛,密布凹陷腺点,侧脉约 5 对,与中脉在上面下陷下面隆起;叶柄极短或近于无柄。穗状花序长 2—5 厘米,宽达 1 厘米,生于茎、枝顶端,偏向于一侧;花具短梗,每 2 花着生于 1 苞片内;苞片覆瓦状排列,连合,宽肾形,脉在边缘突出成为不规则的钻状齿,正中 1 枚刺芒状,外被疏柔毛,其间具腺点,边缘具缘毛。花萼管形,长 2.5 毫米,外面被疏柔毛及腺点,萼齿 5,