

披针形,前2齿稍长,齿先端均刺芒状。花冠淡黄色,长5—6.5毫米,外被疏柔毛,内面无毛,冠筒基部宽0.5毫米,向上渐宽,至喉部宽达2毫米,冠檐二唇形,上唇直立,先端微缺,在凹缺处被长缘毛,下唇稍开展,3裂,中裂片近圆形,侧裂片半圆形,边缘均啮蚀状。雄蕊4,前对较长,外露,花丝无毛,花药卵圆形,2室。花柱纤细,内藏,先端近相等2裂,裂片近线形。小坚果长圆形,长约1毫米,黑褐色。花期9—10月,果期10—11月。

产云南西北及东北部,四川西南部;生于林边、草坡或溪沟边潮湿地,海拔2200—3600米。模式标本采自云南中甸。

23b. 全苞变种

var. **holostegia** Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **13**: 361. 1939.

这一变种与原变种不同在于苞片全缘或仅具1—2齿;花白色。

产云南东北部;生于山麓耕地附近,海拔约2940米。模式标本采自云南会泽。

组3. 香薷组——Sect. *Elsholtzia* Benth. Labiat. Gen. et Sp. 164. 1833; in DC. Prodr. **12**: 163. 1848; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. **2**: 1181. 1876.

穗状花序与阔卵形苞片偏向于一侧;花药线形,药室叉开。

24. 湖南香薷

Elsholtzia hunanensis Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 935. 1936; in Act. Hort. Göthob. **13**: 354. 1939, in clavi.

一年生草本。茎直立,高40—50厘米,通常多分枝,稍粗壮,四棱形,与小枝及叶柄密被皱波状疏柔毛及腺点。叶卵圆形或阔卵圆形,长4—10厘米,宽与长近相等或为长的1/2,先端稍长渐尖,稀近圆形,基部圆形或正中为浅心形,边缘常至最基部为圆齿状牙齿,最下部齿增大,草质,上面被较长及较疏生的短伏毛,下面密被腺点,主沿侧脉上被与上面相同的毛被,侧脉5—6对,弧形,长而开展,常带紫色,网脉稀疏,在下面明显;叶柄纤细,长为叶片1/2,稀为1/3。穗状花序生于茎及枝顶端,亦有腋生,具短梗,长5—12厘米;苞片疏散覆瓦状,近圆形,具突尖,长约3毫米,具艳色,略被腺点,外面被极细的小糙伏毛,边缘密被柔软长纤毛。花萼具短柄,被长柔毛,喉部无毛,萼齿比萼筒长很多,后2齿狭披针形,锐尖,前3齿较短而宽,先端钝,具极短的短尖。花冠玫瑰红色,长2—3毫米,稍超出花萼,外面疏被疏柔毛,冠筒直伸,自基部渐扩大,具疏柔毛毛环,上唇稍短于冠筒,近四方状圆形,微缺,下唇稍短于上唇,3裂至本身基部,中裂片较长,微缺,侧裂片较小,圆形。雄蕊微露,花药二强,圆形。花