

1920; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:65. 1929; Hand. -Mazz. in Act. Hort. Gothob. **13**:355. 1939, in clavi.

一年生矮小草本, 高约 2.5—7 厘米。茎纤细, 被柔毛, 下部裸秃, 上部多叶且密接。叶线形至线状披针形, 长 1—1.5 厘米, 先端钝, 基部渐狭, 边缘具不明显的稀疏锯齿, 两面均稍被短柔毛。穗状花序单独顶生, 短, 偏向一侧; 苞片倒卵形, 暗紫色, 先端具长突尖头, 外面被短柔毛, 边缘具缘毛。花萼小, 管状, 长约 2 毫米, 密被白色绵毛, 萼齿三角形。花冠高脚蝶状, 玫瑰红紫色, 被紫色柔毛, 长约 8 毫米。雄蕊及花柱均伸出花冠外。(标本未见, 摘自原描写)

产云南西北部。模式标本采自云南丽江大具。

27. 台湾香薷

Elsholtzia oldhami Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:277. 1890; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:68. 1929.

小草本, 被蛛丝状短柔毛。茎四棱形, 稍肥厚, 具多数上升的分枝。叶具较长的柄, 纸质或近膜质, 卵圆状披针形, 不连叶柄长 2.5—6.5 厘米, 先端渐尖, 几不锐尖, 基部圆形或近楔形, 边缘具较粗大的锯齿状牙齿, 上面略被细刚毛, 下面被疏而细的蛛丝状短柔毛, 侧脉约 5 对, 在上面明显; 叶柄纤细, 长 1.3—1.9 厘米。花小或微小(只见到花蕾), 排成四列穗状, 穗状花序腋生, 单一, 或顶生, 近无梗, 长约 2.5 厘米或较短, 极密; 苞片被短柔毛, 阔匙状圆形, 先端骤然渐尖, 包被花(及几不包被花?)。花萼被短柔毛, 近相等深 5 齿, 内面无毛。花冠 4 裂, 上唇或上裂片先端微缺。雄蕊 4, 无毛, 花药明显 2 室。子房无毛。(标本未见, 摘自原描写)。

产台湾。模式标本采自台湾。

28. 岩生香薷

Elsholtzia saxatilis (Komarov) Nakai ex Kitagawa in Rep. First Sci. Exped. Manch. IV, **4**:42. 1936, nom. nud. excl. specim.; ibid. **1**:266. 1937; Lineam. Fl. Mansh. 379. 1939; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **13**:358. 1939——*Elsholtzia cristata* Willd. f. *saxatilis* Komarov in Act. Hort. Petrop. **25**:390. 1907; Nakai in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo **26**:146. 1909——*Elsholtzia angustifolia* Loesen. in Beih. Bot. Centralbl. **37** (2):176. 1918, p. p. min.——*Elsholtzia cristata* Willd. var. *saxatilis* Nakai in Bot. Mag. Tokyo **25**:172. 1921, p. p.

直立草本, 高 10—20 厘米。茎淡紫色, 钝四棱形, 具槽, 密被微柔毛, 多分枝。叶披针形至线状披针形, 长 1—4.5 厘米, 宽 0.1—1 厘米, 先端渐尖或略钝, 基部楔形下