

厘米,由多数轮伞花序所组成;苞片近圆形或宽卵圆形,长约5毫米,宽6—7毫米,先端具尾状骤尖,尖头长1—1.5毫米,除边缘被小缘毛外余部无毛,极疏生腺点,染紫色;花梗长不及1毫米,近无毛,序轴被短柔毛。花萼钟形,长2—2.5毫米,外面被白色短硬毛,具腺点,萼齿5,三角形,近相等,先端刺芒尖头,边缘具缘毛。花冠玫瑰红紫色,长6—7毫米,微内弯,近漏斗形,外面密被柔毛,内面有毛环,冠筒基部宽约0.5毫米,向上渐宽,至喉部宽不及2毫米,冠檐二唇形,上唇直立,先端微缺,下唇开展,3裂,中裂片圆形,全缘,侧裂片截形或近圆形。雄蕊4,前对较长,均伸出,花丝无毛。花柱超出雄蕊,先端近相等2浅裂,裂片钻形。小坚果长圆形,长1.5毫米,黑棕色,具小疣。花、果期9—11月。

产辽宁,河北,山东,河南,江苏,江西,浙江,广东;生于山坡路旁或草丛中,海拔200—300米。朝鲜也有。模式标本采自朝鲜。

全草入药,据中华人民共和国药典记载,性辛,微温,功能发表解暑,散湿行水,主治夏月乘凉饮冷伤暑、头痛、发热、恶寒、无汗、腹痛、吐泻、水肿、脚气,用量8分至2钱。

30. **紫花香薷** 野薄荷(浙江昌化),牙刷花(江西广昌),臭草(广东乐昌),荆芥草、假紫苏、土荆芥(广东宝安),金鸡草(广东怀集)

Elsholtzia argyi Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 8:425. 1910; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39:444. 1911; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. 13:359. 1939——*Elsholtzia macrostemon* Hand.-Mazz. in Beih. Bot. Centralbl. 56(3): 458. 1937——*Elsholtzia cristata* auct. non Willd.:Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 6:151. 1915, p. p.——*Elsholtzia patrini* auct. non (Lepech.) Garcke: Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. 9:91. 1935, p. p.

草本,高0.5—1米。茎四棱形,具槽,紫色,槽内被疏生或密集的白色短柔毛。叶卵形至阔卵形,长2—6厘米,宽1—3厘米,先端短渐尖,基部圆形至宽楔形,边缘在基部以上具圆齿或圆齿状锯齿,近基部全缘,上面绿色,被疏柔毛,下面淡绿色,沿叶脉被白色短柔毛,满布凹陷的腺点,侧脉5—6对,与中脉在两面微显著;叶柄长0.8—2.5厘米,具狭翅,腹凹背凸,被白色短柔毛。穗状花序长2—7厘米,生于茎、枝顶端,偏向一侧,由具8花的轮伞花序组成;苞片圆形,长宽约5毫米,先端骤然短尖,尖头刺芒状,长达2毫米,外面被白色柔毛及黄色透明腺点,常带紫色,内面无毛,边缘具缘毛;花梗长约1毫米,与序轴被白色柔毛。花萼管状,长约2.5毫米,外面被白色柔毛,萼齿5,钻形,近相等,先端具芒刺,边缘具长缘毛。花冠玫瑰红紫色,长约6毫

米,外面被白色柔毛,在上部具腺点,冠筒向上渐宽,至喉部宽达2毫米,冠檐二唇形,上唇直立,先端微缺,边缘被长柔毛,下唇稍开展,中裂片长圆形,先端通常具突尖,侧裂片弧形。雄蕊4,前对较长,伸出,花丝无毛,花药黑紫色。花柱纤细,伸出,先端相等2浅裂。小坚果长圆形,长约1毫米,深棕色,外面具细微疣状凸起。花、果期9—11月。

产浙江,江苏,安徽,福建,江西,广东,广西,湖南,湖北,四川,贵州;生于山坡灌丛中,林下,溪旁及河边草地,海拔200—1200米。日本也有分布,越南有栽培。等模式标本采自江苏及贵州平坝。

31. 川滇香薷 木姜菜(四川道孚)

Elsholtzia souliei Lévl. in Fodde, Repert. Sp. Nov. 9:218. Martius 1911, non 1. c. 248. Aprilis 1911; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. 13:360. 1939—*Elsholtzia cristata* auct. non Willd.: Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 6:151. 1915, p. p.—*Elsholtzia patrini* auct. non (Lepech.) Garcke: Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:935. 1936, p. p. min.

纤细草本,高10—50厘米。茎直立,自基部尖塔形分枝,小枝成45°张开,被白色弯卷的短柔毛。叶披针形,一般长0.3—2厘米,稀长达4厘米,宽0.2—0.4厘米,稀宽达1.3厘米,先端渐尖,基部渐狭,边缘具锯齿,上面绿色或常染紫红色,被微柔毛,下面较淡,被柔毛及淡黄色透明的腺点,侧脉约4对,与中脉在上面不明显下面隆起。穗状花序顶生,长1.2—4厘米,生于茎、枝顶上,由具多花的轮伞花序组成;苞片近圆形,长4.5毫米,宽4毫米,先端具芒尖,外面被白色柔毛,内面无毛,边缘具缘毛,脉稍带紫色。花萼管状,长约2.5毫米,外面被白色柔毛及腺点,萼齿5,不相等,前2齿较长,先端刺芒状,边缘具缘毛。花冠紫色,长约6毫米,外面被白色短柔毛及腺点,冠筒自基部向上渐扩大,冠檐二唇形,上唇直立,先端微缺,边缘密被紫色具节长柔毛,下唇稍开展,3裂,中裂片圆形,全缘,先端具小突尖,侧裂小,弧形,被极稀的缘毛。雄蕊4,前对较长,均伸出,花丝无毛,花药黑紫色。花柱伸出,先端相等2浅裂。小坚果长圆形,长约1.2毫米,深棕色。花、果期9—11月。

产四川西部,云南;生于山坡、草丛,海拔2800—3300米。模式标本采自四川康定西部东俄洛。

全草入药,治小儿惊风。

32. 高原香薷 小红苏(云南昭通),野木香叶(四川马尔康)

Elsholtzia feddei Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 9:218. 1911; Hand.