

米,外面被白色柔毛,在上部具腺点,冠筒向上渐宽,至喉部宽达2毫米,冠檐二唇形,上唇直立,先端微缺,边缘被长柔毛,下唇稍开展,中裂片长圆形,先端通常具突尖,侧裂片弧形。雄蕊4,前对较长,伸出,花丝无毛,花药黑紫色。花柱纤细,伸出,先端相等2浅裂。小坚果长圆形,长约1毫米,深棕色,外面具细微疣状凸起。花、果期9—11月。

产浙江,江苏,安徽,福建,江西,广东,广西,湖南,湖北,四川,贵州;生于山坡灌丛中,林下,溪旁及河边草地,海拔200—1200米。日本也有分布,越南有栽培。等模式标本采自江苏及贵州平坝。

31. 川滇香薷 木姜菜(四川道孚)

Elsholtzia souliei Lévl. in Fodde, Repert. Sp. Nov. **9**:218. Martius 1911, non 1. c. 248. Aprilis 1911; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **13**:360. 1939—*Elsholtzia cristata* auct. non Willd.: Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:151. 1915, p. p.—*Elsholtzia patrini* auct. non (Lepech.) Garcke: Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:935. 1936, p. p. min.

纤细草本,高10—50厘米。茎直立,自基部尖塔形分枝,小枝成45°张开,被白色弯卷的短柔毛。叶披针形,一般长0.3—2厘米,稀长达4厘米,宽0.2—0.4厘米,稀宽达1.3厘米,先端渐尖,基部渐狭,边缘具锯齿,上面绿色或常染紫红色,被微柔毛,下面较淡,被柔毛及淡黄色透明的腺点,侧脉约4对,与中脉在上面不明显下面隆起。穗状花序顶生,长1.2—4厘米,生于茎、枝顶上,由具多花的轮伞花序组成;苞片近圆形,长4.5毫米,宽4毫米,先端具芒尖,外面被白色柔毛,内面无毛,边缘具缘毛,脉稍带紫色。花萼管状,长约2.5毫米,外面被白色柔毛及腺点,萼齿5,不相等,前2齿较长,先端刺芒状,边缘具缘毛。花冠紫色,长约6毫米,外面被白色短柔毛及腺点,冠筒自基部向上渐扩大,冠檐二唇形,上唇直立,先端微缺,边缘密被紫色具节长柔毛,下唇稍开展,3裂,中裂片圆形,全缘,先端具小突尖,侧裂小,弧形,被极稀的缘毛。雄蕊4,前对较长,均伸出,花丝无毛,花药黑紫色。花柱伸出,先端相等2浅裂。小坚果长圆形,长约1.2毫米,深棕色。花、果期9—11月。

产四川西部,云南;生于山坡、草丛,海拔2800—3300米。模式标本采自四川康定西部东俄洛。

全草入药,治小儿惊风。

32. 高原香薷 小红苏(云南昭通),野木香叶(四川马尔康)

Elsholtzia feddei Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **9**:218. 1911; Hand.