

米,外面被白色柔毛,在上部具腺点,冠筒向上渐宽,至喉部宽达2毫米,冠檐二唇形,上唇直立,先端微缺,边缘被长柔毛,下唇稍开展,中裂片长圆形,先端通常具突尖,侧裂片弧形。雄蕊4,前对较长,伸出,花丝无毛,花药黑紫色。花柱纤细,伸出,先端相等2浅裂。小坚果长圆形,长约1毫米,深棕色,外面具细微疣状凸起。花、果期9—11月。

产浙江,江苏,安徽,福建,江西,广东,广西,湖南,湖北,四川,贵州;生于山坡灌丛中,林下,溪旁及河边草地,海拔200—1200米。日本也有分布,越南有栽培。等模式标本采自江苏及贵州平坝。

31. 川滇香薷 木姜菜(四川道孚)

Elsholtzia souliei Lévl. in Fodde, Repert. Sp. Nov. 9:218. Martius 1911, non 1. c. 248. Aprilis 1911; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. 13:360. 1939—*Elsholtzia cristata* auct. non Willd.: Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 6:151. 1915, p. p.—*Elsholtzia patrini* auct. non (Lepech.) Garcke: Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:935. 1936, p. p. min.

纤细草本,高10—50厘米。茎直立,自基部尖塔形分枝,小枝成 45° 张开,被白色弯卷的短柔毛。叶披针形,一般长0.3—2厘米,稀长达4厘米,宽0.2—0.4厘米,稀宽达1.3厘米,先端渐尖,基部渐狭,边缘具锯齿,上面绿色或常染紫红色,被微柔毛,下面较淡,被柔毛及淡黄色透明的腺点,侧脉约4对,与中脉在上面不明显下面隆起。穗状花序顶生,长1.2—4厘米,生于茎、枝顶上,由具多花的轮伞花序组成;苞片近圆形,长4.5毫米,宽4毫米,先端具芒尖,外面被白色柔毛,内面无毛,边缘具缘毛,脉稍带紫色。花萼管状,长约2.5毫米,外面被白色柔毛及腺点,萼齿5,不相等,前2齿较长,先端刺芒状,边缘具缘毛。花冠紫色,长约6毫米,外面被白色短柔毛及腺点,冠筒自基部向上渐扩大,冠檐二唇形,上唇直立,先端微缺,边缘密被紫色具节长柔毛,下唇稍开展,3裂,中裂片圆形,全缘,先端具小突尖,侧裂小,弧形,被极稀的缘毛。雄蕊4,前对较长,均伸出,花丝无毛,花药黑紫色。花柱伸出,先端相等2浅裂。小坚果长圆形,长约1.2毫米,深棕色。花、果期9—11月。

产四川西部,云南;生于山坡、草丛,海拔2800—3300米。模式标本采自四川康定西部东俄洛。

全草入药,治小儿惊风。

32. 高原香薷 小红苏(云南昭通),野木香叶(四川马尔康)

Elsholtzia feddei Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 9:218. 1911; Hand.

Mazz. in Act. Hort. Göthob. **13**:359. 1939—*Elsholtzia patrini* auct. non (Lepech.) Garcke:Hand. Mazz. in Act. Hort. Gothob. **9**:91. 1934, p. p.

细小草本,高3—20厘米。茎自基部分枝,小枝尤其是在下部的依伏或上升,被短柔毛。叶卵形,长4—24毫米,宽3—14毫米,先端钝,基部圆形或阔楔形,边缘具圆齿,上面绿色,下面较淡,或下面常带紫色,上面密被短柔毛,下面被短柔毛,但沿脉上较长而密,腺点稀疏或不明显,侧脉约5对,与中脉在上面略凹陷下面显著;叶柄长2—8毫米,扁平,被短柔毛。穗状花序长1—1.5厘米,生于茎、枝顶端,偏于一侧,由多花轮伞花序组成;苞片圆形,长宽约3毫米,先端具芒尖,外面被柔毛,在脉上尤为明显;边缘具缘毛,内面无毛,脉紫色;花梗短,与序轴被白色柔毛。花萼管状,长约2毫米,外面被白色柔毛,萼齿5,披针状钻形,具缘毛,长短不相等,通常前2枚较长,先端刺芒状。花冠红紫色,长约8毫米,外被柔毛及稀疏的腺点,冠筒自基部向上扩展,冠檐二唇形,上唇直立,先端微缺,被长缘毛,全缘,下唇较开展,3裂,中裂片圆形,全缘,侧裂片弧形。雄蕊4,前对较长,均伸出,花丝无毛。花柱纤细,伸出,先端相等2浅裂。小坚果长圆形,长约1毫米,深棕色。花、果期9—11月。

产四川,云南及西藏;生于路边、草坡及林下,海拔2800—3200米。模式标本采自四川康定西部东俄洛。

可分四个变型。一、**原变型** f. **feddei**。二、**粗壮变型** f. **robusta** C. Y. Wu et S. C. Huang in Act. Phytotax. Sin. **12**(3):345. 1974 亦称小荆芥(北京),木香菜(四川马尔康),与原变型不同在于植株较粗壮,叶较大,产河北,山西,陕西,甘肃,青海,四川,云南,生于谷地、村边、路旁、林下或田野,海拔1550—3700米,模式标本采自四川康定。三、**异叶变型** f. **heterophylla** C. Y. Wu et S. C. Huang in Act. Phytotax Sin. **12**(3):345. 1974 与原变型不同在于叶卵形、倒卵形、椭圆形至近圆形,产四川西部,海拔3700—4600米的坡地上,模式标本采自四川康定。四、**疏苞变型** f. **remotibracteata** C. Y. Wu et S. C. Huang in Act. phytotax. Sin. **12**(3):345. 1974 与原变型不同在于苞片圆形而疏离,产四川,生于谷地,海拔2600—3500米,模式标本采自四川。

云南昭通用全草治感冒。

33. **香蒿**(植物名实图考,引名医别录) 水芳花、山苏子(黑龙江、吉林、河北、山西),青龙刀香蒿(黑龙江),荆芥、小荆芥、拉拉香、小叶苏子(辽宁)、蜜蜂草、水荆芥、臭香麻、真荆芥(河北),臭荆芥(辽宁、甘肃华池、河北),荆芥(甘肃成县),边枝花(浙江),酒饼叶(广西阳朔),排香草(广西),山苏子、香草、蜜蜂草(福建福州)、野紫苏(四川灌