

果三棱状椭圆形,黄褐色,具金黄色腺点。

约 6 种,分布于我国至日本。我国有 4 种,1 变种,产四川,贵州,湖南,广东,江西,安徽,浙江,江苏及台湾。

分 种 检 索 表

1. 茎、叶柄、中脉及侧脉上均被平展的须状刚毛;叶薄纸质,先端骤尖,基部宽楔形下延至较长的柄,边缘有粗大的尖锯齿;苞片草质,大,卵圆状菱形,具突尖;花萼及花冠外面有白色星状小绒毛;花冠筒内面毛环狭小而不十分密集……………2. 天人草 *C. japonica* (Miq.) S. Moore
1. 老茎、叶柄、中脉及侧脉上无毛或近无毛或被星状绒毛;叶纸质,先端渐尖,基部宽楔形渐狭至极短的柄,边缘具锯齿;苞片明显从叶状过渡到鳞片状,纸质,锐尖而小;花萼及花冠有星状绒毛;花冠筒内面毛环宽大而极密集。
 2. 叶较大,卵圆状长圆形,阔椭圆形或椭圆形,长 7—13 (20) 厘米,宽 4—8 (9.5) 厘米,老叶毛被脱落,幼叶毛被明显;穗状花序甚伸长,其间轮伞花序位于下部常间断而远离……………1. 绵穗苏 *C. ningpoensis* (Hemsl.) Hand.-Mazz.
 2. 叶较小,卵圆形,长 7—10 厘米,宽 3.5—4 厘米,老叶仅在上面沿脉上被星状毛或硬毛,幼叶毛被不明显,仅上面疏生星状毛;穗状花序短小,长 10 厘米,其间轮伞花序密集几无间断……………3. 南川绵穗苏 *C. nanchuanensis* C. Y. Wu et H. W. Li

附:台湾绵穗苏 *Comanthosphace formosana* Ohwi in Act. Phytotax. Geobot. 4:67. 1935 [*Leucosceptrum stellipilum* (Miq.) Kitamura et Murata var. *formosanum* (Ohwi) Kitamura et Murata in Act. Phytotax. Geobot. 20:171. 1962; *Comanthosphace stellipila* auct. non Miq.; Yamamoto in Suppl. Fl. Formos. 4:21. 1928] 因未见标本,不充分理解,在此次编写中暂不列入。

1. 绵穗苏(植物分类学报 8 卷 1 期) 半边苏、野鱼香、野苏(贵州兴义),火胡麻(贵州绥阳)

Comanthosphace ningpoensis (Hemsl.) Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:936. 1936; et in Act. Hort. Gothob. 13:361. 1939, in nota; C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. 8 (1): 51. 1959——*Caryopteris? ningpoensis* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 264. 1890——*Leucosceptrum ningpoense* (Hemsl.) Kitamura et Murata in Act. Phytotax. Geobot. 20:167, f. 5—6. 1962——*Comanthosphace sublanceolata* auct. non (Miq.) S. Moore: 孙雄才,科学社生物所论文集 7: 231. 1932.

1a. 绵穗苏(原变种) 图版 72:1—6

var. ***ningpoensis***

多年生草本,直立,具密生须根的木质根茎。茎高 60—100 厘米,基部圆柱形,上部钝四棱形,微具槽,除茎顶花序被白色星状绒毛外,余部近无毛,干时黄褐色,近茎顶紫褐色,节间短于叶片。叶卵圆状长圆形,阔椭圆形或椭圆形,长 7—13 (20) 厘米,宽