

80. 香筒草属——*Keiskea* Miq.

Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. 2:105. 1865—66.

草本或半灌木。叶具齿，具柄，苞叶退化成苞片。轮伞花序2花，组成顶生及腋生的总状花序；苞片小，不显著，排列稀疏，或较大，显著而排列近覆瓦状，但均为宿存；花梗短。花萼钟形，外面略被毛，内面在萼齿间有毛束，萼齿5，深裂，齿近相等，或后齿略小。花冠白，带黄色或染以紫色，小，冠筒基部狭，向上渐宽扩展成喉部，微伸出，内面在中部附近在雄蕊着生处下方有疏柔毛或柔毛状髯毛环，冠檐近二唇形，上唇2裂，下唇3裂，中裂片较长，平伸，侧裂片相等，圆形。雄蕊4，伸出，稀内藏，前对较长，花丝分离，无毛，无附属器，花药2室，室略叉开，先端贯通。花柱丝状，先端2浅裂，裂片钻形或近线形，近相等或不相等。花盘斜环状，后面呈指状膨大，其长常超出子房。小坚果近球形，无毛。

约6种，分布于我国和日本。我国产5种，分布于江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广东、湖北、四川及云南东北部。

分 种 检 索 表

1. 苞片较小，不太显著，排列稀疏。
 2. 叶较宽，卵形或卵状长圆形至长圆形。
 3. 花冠深紫色，长1.1厘米，下唇中裂片最宽大，具极密的白色髯毛及红色腺点 3. 南方香筒草 *K. australis* C. Y. Wu et H. W. Li
 3. 花冠白色或淡紫色，长5或8毫米，下唇中裂片较小，被疏髯毛及疏腺点。
 4. 叶卵形，长10—15厘米，宽4—6.5厘米，先端渐尖至尾状渐尖，基部楔形至近圆形；茎被倒向小疏柔毛 2. 中华香筒草 *K. sinensis* Diels
 4. 叶卵状长圆形或长圆形，上部的较大，长6—9厘米，宽2.5—4厘米，先端渐尖或钝，基部圆形或楔形，下部的较小，长仅3.5厘米，基部渐狭；茎被白色具节卷曲长柔毛 4. 腺毛香筒草 *K. glandulosa* C. Y. Wu
 2. 叶披针形或长圆状披针形，长3.5—14.5厘米，宽1.2—5.4厘米，先端为略偏的尾状长渐尖，基部渐狭或钝，通常不对称 5. 香筒草 *K. szechuanensis* C. Y. Wu
1. 苞片较大，阔卵状圆形，排列近覆瓦状 1. 香蓍状香筒草 *K. elsholtzioides* Merr.

1. 香蓍状香筒草 香蓍状霜柱(植物分类学报8卷1期) 图版73

Keiskea elsholtzioides Merr. in Sunyatsenia 3:258. 1937; C. Y. Wu in Act

图版73: 香蓍状香筒草 *Keiskea elsholtzioides* Merr., 1. 花枝; 2. 花, 侧面观; 3. 花萼纵剖, 内面观, 兼示雌蕊; 4. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 5. 小坚果, 背面观。(曾孝濂绘)