

5 毫米,被贴生短柔毛,在枝顶上的穗状花序较疏松,圆锥状;苞片卵圆状披针形,绿色,长 3 毫米,比花萼短。花萼狭钟形,长 4 毫米,外被短柔毛,齿三角形,急尖,等大,长为萼筒 1/3。花冠淡紫色,长 7 毫米,裂片边缘被疏缘毛状短柔毛,余部无毛,裂片近相等。花丝近上升,被髯毛。花柱的裂片近相等,长 1.5 毫米。小坚果宽卵珠形,光滑。(标本未见,摘自原描写)。

产广东沿海岛屿。模式标本采自香港。

4. 台湾刺蕊草

Pogostemon formosanus Oliv. in Hook. Icon. Pl. 25: pl. 2440. 1890; Henry. in Trans. Asiat. Soc. Japan. 24 Suppl.: 72. 1896; Matsum. et Hayata, Enum. Pl. Formos. in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 22:547. 1906; Matsum. Ind. Pl. Jap. 2(2): 547. 1912; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2:52. 1929.

草本,分枝;老茎近圆柱形,幼茎及枝具四稜及四槽,初被短毛,后渐变无毛。叶菱状披针形或卵圆形,长 4—10 厘米,宽 1—5 厘米,先端变锐尖或短渐尖,基部楔状渐狭而成柄,边缘在中部以下全缘,在中部以上具不规则的缺刻状齿裂,近膜质,上面被小粗伏毛,老时渐脱落,下面仅沿脉被小粗伏毛,具不明显的腺点,侧脉 2—3 对,与中脉在上面近平坦下面稍隆起;叶柄细长,较长的可达 4.5 厘米,腹凹背凸,被短粗伏毛。聚伞花序(1) 5—8 花,具短梗或近无梗,排列成顶生或腋生、长 2—8 厘米的穗状花序,穗状花序常 3 个并生;花无梗或近无梗;苞片及小苞片线状披针形或线形,长 2—3 毫米,具缘毛。花萼近筒状,长 4 毫米,膜质,外疏被短柔毛,齿钻状披针形,相等,具缘毛,长约为萼筒 1/3。花冠淡紫色,长约 5 毫米,稍伸出花萼。雄蕊外伸,被髯毛部分不外露。花柱先端相等 2 浅裂。花盘环状。小坚果卵圆形。

产台湾。模式标本采自台湾。

5. 广藿香(广州植物志) 藿香(广东广州、福建厦门)

Pogostemon cablin (Blanco) Benth. in DC. Prodr. 12:156. 1848; Miq. Fl. Ind. Bat. 2:964. 1859; Prain in Journ. Asiat. Soc. Bengal 74 (2):708. 1907; in Kew Bull Misc. Inf. 1908:78. 1908; Merr. Enum. Philip. 3:414. 1923; 侯宽昭,广州植物志, 638. 1956; Back. & Bakh. f. Fl. Java 2:633. 1965; H. Keng in Gard. Bull. Singapore 24:154. 1969——*Mentha cablin* Blanco, Fl. Filip. 473. 1837——*Pogostemon patchouli* Pellet. in Mem. Soc. Sc. Orleans 5:277, t. 7. 1845——*Pogostemon patchouli* Pellet. var. *suavis* Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4:634. 1885——*Pogostemon javanicus* Backer ex Adelb. in Reinwardtia 3:150, f. l. 1954; Back. & Bakh. f. Fl. Java 2:632. 1965