

多年生芳香草本或半灌木。茎直立,高 0.3—1 米,四棱形,分枝,被绒毛。叶圆形或宽卵圆形,长 2—10.5 厘米,宽 1—8.5 厘米,先端钝或急尖,基部楔状渐狭,边缘具不规则的齿裂,草质,上面深绿色,被绒毛,老时渐稀疏,下面淡绿色,被绒毛,侧脉约 5 对,与中肋在上面稍凹陷或近平坦,下面突起;叶柄长 1—6 厘米,被绒毛。轮伞花序 10 至多花,下部的稍疏离,向上密集,排列成长 4—6.5 厘米宽 1.5—1.8 厘米的穗状花序,穗状花序顶生及腋生,密被长绒毛,具总梗,梗长 0.5—2 厘米,密被绒毛;苞片及小苞片线状披针形,比花萼稍短或与其近等长,密被绒毛。花萼筒状,长 7—9 毫米,外被长绒毛,内被较短的绒毛,齿钻状披针形,长约为萼筒 1/3。花冠紫色,长约 1 厘米,裂片外面均被长毛。雄蕊外伸,具髯毛。花柱先端近相等 2 浅裂。花盘环状。花期 4 月。

台湾、广东海南和广州、广西南宁、福建厦门等地广为栽培,供药用。印度、斯里兰卡经马来西亚至印度尼西亚及菲律宾也有。模式标本采自菲律宾。

梗、叶或叶供药用,主用于妊娠呕吐、胃气痛及预防流感,为芳香健胃、解热、镇吐剂。又为一芳香植物,其芳香油具有浓烈的香味,可作优良的定香剂,同时又是白玫瑰和馥奇型香精的调合原料,又可与香根草油共用作为东方型香精的调合基础。

6. 短冠刺蕊草(植物分类学报 11 卷 1 期) 马鹿菜(云南龙陵)

Pogostemon brevicorollus Sun ex C. H. Hu in Act. Phytotax. Sin. **11**(1); 49, pl. VI, f. 16—19. 1966.

草本或半灌木。茎直立,有分枝,钝四棱形,具四浅槽,初被短柔毛,后变无毛。叶披针状卵形或卵形,长 6—13 厘米,宽 1.5—6.5 厘米,先端渐尖,基部楔形,边缘除基部全缘外均具重锯齿,草质,上面暗绿色,疏被微柔毛,下面较淡,脉上有短硬毛;叶柄长 1—3 厘米,被短柔毛。轮伞花序由两个具 6—7 花的聚伞花序组成,球形,径 6—8 毫米,无梗,排列成间断的长 (2)4—9(11) 厘米的穗状花序,穗状花序顶生及腋生,组成圆锥花序。花萼卵状筒形,长 2—2.5 毫米,外面近无毛或仅沿脉上被短柔毛,内面无毛,齿 5,三角形,相等,长约 0.5 毫米,具缘毛,果时闭合。花冠比花萼短或近相等,长 2—2.1 毫米,外面无毛,冠筒长约 1.6 毫米,裂片近等长,正三角形,先端钝。雄蕊 4,外伸,花丝中部被髯毛,髯毛部分不伸出花冠。花柱先端相等 2 浅裂,裂片钻形。花盘环状。小坚果倒卵形,长 0.8 毫米,黑色,光滑。花、果期 9—11 月。

产云南西部、西南部、中南部及东南部,四川西南部;生于山谷或林中,海拔 1200—2300 米。模式标本采自云南漾濞至永平间。

7. 刺蕊草 鸡挂骨草(云南思茅),野靛(云南景东) 图版 77:7—10