

雄蕊外伸,近两倍超出花冠,中部被绵毛。(标本未见,摘自原描写)

产云南西北部;生于多石山坡灌丛中,海拔 1600—2000 米。模式标本采自云南福贡。

9. **膜叶刺蕊草** 鸡骨头菜(云南麻栗坡),爬努阿帕(云南红河哈尼语),野蓝靛(广西田林)

Pogostemon esquirolii (Lévl.) C. Y. Wu et Y. C. Huang, 云南植物志 1: 743, 图版 179, 1—2. 1976——*Caryopteris esquirolii* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 9:449. 1911; Fl. Kouy-Tcheou 440. 1915——*Pogostemon glaber* auct. non Benth.: Merr. in Lingnan Agr. Rev. 2:137. 1925; Rehd. in Journ. Arn Arb. 15:311. 1935.

9a. **膜叶刺蕊草**(原变种) 图版77: 1—6

var. **esquirolii**

草本或半灌木。茎高 1—1.5 米,四棱形,分枝,初时被短柔毛,后渐变稀疏。叶卵圆形,长达 12 厘米,宽达 7(9) 厘米,先端渐尖,基部骤然渐狭或楔状渐狭,稀有近圆形,边缘具重圆齿或重锯齿,膜质或近纸质,上面被粗伏毛或稀有密被长柔毛,下面近无毛或仅沿叶脉被短柔毛,侧脉 5 对,与中脉在上面近平坦,下面略隆起;叶柄细长,长 1.5—7 厘米,被长柔毛。轮伞花序密集,多花,排列成近圆柱状的连续穗状花序,稀有间断的,穗状花序顶生及腋生,长 3—7 厘米,稀有达 15 厘米,具总梗,梗长 1—2.5 厘米,密被柔毛;小苞片卵圆形,长约为花萼长 $1/2$ — $1/3$,两面无毛或近无毛,具缘毛。花萼近筒状,长 4—5 毫米,外面无毛或仅沿脉上略被短柔毛,内面无毛,齿 5,等长,狭三角形,长约为萼筒 $1/3$,内被硬毛及缘毛。花冠白或淡紫色,长约 6—7 毫米,裂片外被短髯毛。雄蕊长伸出花冠,伸出部分与花冠等长,被髯毛部分伸出花冠。花柱与雄蕊近等长,先端相等 2 裂。花盘杯状,具 4 圆齿。花期 12 月至翌年 4 月。

产云南南部、东南部,广西,贵州,广东海南;生于山谷、溪边及路旁,海拔 2000 米以下。模式标本采自贵州。

云南红河用枝、叶入药,治子宫脱垂。

9b. **金平变种**

var. **tsingpingensis** C. Y. Wu et Y. C. Huang, 云南植物志 1:743 1976.

这一变种与原变种不同在于茎、叶、小苞片及花萼外面均被长柔毛。

产云南东南部;生于阳坡上,海拔 1400 米。模式标本采自云南金平。