

10. 长柱刺蕊草

Pogostemon griffithii Prain in Kew Bull. Misc. Inf. 1908: 181. 1908.

10a. 长柱刺蕊草(原变种)

var. *griffithii*

产缅甸。未见于我国。原变种叶较狭,长 10 厘米,宽 2.5—3 厘米;花萼较小,长约 4 毫米;穗状花序较小,长 2—6 厘米,宽 8 毫米。

10b. 宽叶变种

var. *latifolius* C. Y. Wu et Y. C. Huang, 云南植物志 1: 743. 1976.

草本。茎直立,高可达 2 米,钝四棱形,具四槽,被紧贴的短柔毛。叶卵圆形或宽卵圆形,长 5.5—8.5 厘米,宽 3.5—5.8 厘米,先端急尖,基部钝,边缘具不整齐的重锯齿,草质,上面绿色,被紧贴短柔毛,下面淡绿色,密被短柔毛,侧脉 3 对,与中脉在上面微突起下面明显隆起,网脉在下面明显;叶柄长 0.5—1.5 厘米,腹凹背凸,密被紧贴短柔毛。轮伞花序多花密集,排列成长 (1.5) 5—10 厘米宽约 1.2 厘米的圆柱状穗状花序,穗状花序下部 2—3 个轮伞花序间断,上部轮伞花序连续,顶生及腋生,具总梗,梗长 0.5—3.5 厘米,密被紧贴短柔毛;小苞片卵状披针形或披针形,长约 2—2.5 毫米,密被短柔毛,具缘毛。花萼狭钟形,长 4—5 毫米,外被短柔毛,齿 5,相等,三角状披针形,长约等于萼筒 1/2。花冠淡蓝色,长约 6 毫米,外面上唇片略被短柔毛。雄蕊 4,长外伸,被髯毛部分伸出花冠。花柱先端相等 2 裂,裂片长 2—2.5 毫米,紫色。花盘杯状。花期 3 月。

产云南西南部;生于山腰河旁密林中,海拔 700 米。模式标本采自云南西盟。

11. 苍耳叶刺蕊草

Pogostemon xanthiiphyllus C. Y. Wu et Y. C. Huang, 云南植物志 1: 744, 图版 179, 9—10. 1976.

草本。茎高约 1 米,多分枝,茎、枝钝四棱形,具四槽,密被细刚毛,节处稍膨大。叶卵圆形或宽卵圆形,长 3—8 厘米,宽 2—7 厘米,先端急尖或短渐尖,基部宽楔形或钝,边缘具缺刻状重锯齿,草质,上面深绿色,下面较淡,两面均密被细刚毛,侧脉约 3 对,与中脉两面稍突出;叶柄长 0.5—4 厘米,腹平背凸,密被细刚毛。轮伞花序 3—14 个排列成下部间断上部连续的穗状花序,穗状花序顶生及腋生,单一或 3 个并生,长 2—11 厘米,具总梗,梗长 0.5—2 厘米,密被细刚毛;小苞片长圆状披针形或卵圆状披针形,比花萼稍短或近等长,无柄,两面中脉被数条刚毛,边缘被细刚毛。花萼筒状,长约 4 毫米,外面沿脉上疏被细刚毛,内面略被短柔毛,齿 5,近相等,三角状披针形,