

南,印度尼西亚,菲律宾也有。模式标本采自印度尼西亚的爪哇。

15. **水珍珠菜** 毛水珍珠菜(广州植物志),毛射草(广东临高、儋县),牛触臭(广东文昌) 图版 79: 1—7

Pogostemon auricularius (Linn.) Hassk. in Tijdsch. Nat. Geschied. **10**:127. 1843; Cat. Bog. 131. 1858; Miq. Fl. Ind. Bat. **2**:964. 1859; H. Keng in Gard. Bull. Singapore **24**:180. 1969——*Mentha auricularis* Linn. Mant. Pl. **1**:81. 1767; Roxb. Fl. Ind. **3**:4. 1832; Griff. Notul. **4**:250. 1854——*Mentha foetida* Burm. f. Fl. Ind. 126. 1768——*Dysophylla auricularia* (Linn.) Bl. Bijdr. 825. 1826; Benth. in Wall. Cat. n. 1548. 1828; in Wall. Pl. Asiat. Rar. **1**:30. 1830; Labiat. Gen. et Sp. 158. 1833; in DC. Prodr. **12**:156. 1848; Fl. Hongk. 275. 1861; Wight, Icon. Pl. Ind. Or. **4**(3): t. 1445. 1849; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 638. 1885; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:276. 1890; Pottinger & Prain in Rec. Bot. Sur. Ind. **1**:260. 1896; Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **4**, **3a**:330, t. 102, B. 1897; Craib in Kew Bull. Misc. Inf **5**:430. 1905; Dunn & Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**:208. 1912; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:147. 1915; Merr. in Lingnan Agr. Rev. **2**:137. 1925; Doan in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine **4**:964. 1936; Hand.-Mazz. in Beih. Bot. Centralbl. **56B**(3):459. 1937; 侯宽昭,广州植物志, 638. 1956; Mukerj. in Rec. Bot. Surv. Ind. **14**(1):79. 1940; Back. & Bakh. f. Fl. Java **2**:633. 1965; H. Keng in Gard. Bull. Singapore **24**:67. f. 11 a-d. 1969.

一年生草本。茎高 0.4—2 米,基部平卧,节上生根,上部上升,多分枝,具槽,密被黄色平展长硬毛。叶长圆形或卵状长圆形,长 2.5—7 厘米,宽 1.5—2.5 厘米,先端钝或急尖,基部圆形或浅心形,稀楔形,边缘具整齐的锯齿,草质,上面榄绿色,下面较淡,两面被黄色糙硬毛,下面满布凹陷腺点,侧脉 5—6 对,与中脉在上面平坦下面明显;叶柄短,稀长至 1.2 厘米,密被黄色糙硬毛,上部叶近无柄。穗状花序长 6—18 厘米,花期先端尾状渐尖,直径约 1 厘米,连续,有时基部间断;苞片卵状披针形,常与花冠等长,边缘具糙硬毛。花萼钟形,小,长宽约 1 毫米,仅萼齿边缘具疏柔毛,其余部分无毛,但具黄色小腺点,萼齿 5,短三角形,长约为萼筒 1/4。花冠淡紫至白色,长约为花萼长之 2.5 倍,无毛。雄蕊 4,长长地伸出,伸出部分具髯毛。花柱不超出雄蕊,先端相等 2 浅裂。花盘环状。小坚果近球形,直径约 0.5 毫米,褐色,无毛。花、果期 4—11 月。

产江西,福建,台湾,广东,广西及云南;生于疏林下湿润处或溪边近水潮湿处,海

拔 300—1700 米。锡金,印度,斯里兰卡,缅甸,泰国,老挝,柬埔寨,越南,马来西亚至印度尼西亚及菲律宾也有,最东达伊里安岛。模式标本采自印度(?)。

广东用全草入药,煎水治小儿惊风或用于洗伤口。

16. 镰叶水珍珠菜 (植物分类学报 10 卷 3 期)

Pogostemon falcatus (C. Y. Wu) C. Y. Wu et H. W. Li in Act. Phytotax. Sin **13**(1):76. 1975——*Dysophylla falcata* C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **10**(3): 237. 1965.

直立草本;根茎木质。茎高 30—40 厘米,分枝,基部几木质化,全茎密被平伏长硬毛,上部因被毛极密而呈灰白色,近圆柱形,节稍膨大。叶长镰形,长 4.5—6.5 厘米,宽 4—7 毫米,先端渐尖,基部渐狭,边缘下部近全缘,其上具疏锯齿,草质,上面榄绿色,下面略淡,两面均被平伏绢毛,脉上尤密,中肋两面隆起,侧脉 3—5 对,在下面极明显;叶柄极短,腹平背凸,密被平伏绢毛。穗状花序长 4.5—5.5 厘米,直径约 6.5 毫米,密集,基部衬有苞叶;苞片线形,略超出花萼,密被绢毛。花萼长约 1.7 毫米,宽约 1 毫米,膜质,外面被疏柔毛,萼齿 5,短小。花冠红色,干后变黑色,为花萼长之 1.5 倍。雄蕊 4,伸出,花丝干后呈黑色,其上毛茸较少。小坚果未见。花期 10 月。

产云南南部;生于水边石上,海拔 800 米。模式标本采自云南景洪。

82. 水蜡烛属 ——**Dysophylla** Bl. ex El-Gazzar et Watson,
emend. nom. conserv.

Bl. ex El-Gazzar et Watson in Taxon **16**: 186—189, 1967.
emend.; Airy Shaw in ibid. **16**: 189—190. 1967——*Alopecuro-veronica* Linn. Amoen. Acad. **4**:143. 1759; Back. et. Bakh. f. Fl. Java **2**:633. 1965, in obs.; H.Keng in Gard. Bull. Singapore **24**:67. 1969, in nota——*Eusteralis* Rafin. in Fl. Tellur. **2**:95. 1836; Bakh. f. et van Steenis in Taxon **17**:235, 236. 1968.

草本植物。茎具通气组织。叶 3—10 枚轮生,无柄,线形至倒披针形,全缘或具疏齿,通常近无毛。轮伞花序多花,在茎或分枝顶部密集组成紧密而连续或极少于基部

图版 79: 1—7. 水珍珠菜 **Pogostemon auricularius** (Linn.) Hassk., 1. 植株上部; 2. 苞片, 正面观; 3. 花, 侧面观; 4. 花萼纵剖, 内面观; 5. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 6. 雌蕊; 7. 小坚果, 背面观。8. 水虎尾 (原变种) **Dysophylla stellata** (Lour.) Benth. var. **stellata**, 8. 植株。(曾孝濂绘)

