

拔 300—1700 米。锡金,印度,斯里兰卡,缅甸,泰国,老挝,柬埔寨,越南,马来西亚至印度尼西亚及菲律宾也有,最东达伊里安岛。模式标本采自印度(?)。

广东用全草入药,煎水治小儿惊风或用于洗伤口。

16. 镰叶水珍珠菜 (植物分类学报 10 卷 3 期)

Pogostemon falcatus (C. Y. Wu) C. Y. Wu et H. W. Li in Act. Phytotax. Sin **13**(1):76. 1975——*Dysophylla falcata* C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **10**(3): 237. 1965.

直立草本;根茎木质。茎高 30—40 厘米,分枝,基部几木质化,全茎密被平伏长硬毛,上部因被毛极密而呈灰白色,近圆柱形,节稍膨大。叶长镰形,长 4.5—6.5 厘米,宽 4—7 毫米,先端渐尖,基部渐狭,边缘下部近全缘,其上具疏锯齿,草质,上面榄绿色,下面略淡,两面均被平伏绢毛,脉上尤密,中肋两面隆起,侧脉 3—5 对,在下面极明显;叶柄极短,腹平背凸,密被平伏绢毛。穗状花序长 4.5—5.5 厘米,直径约 6.5 毫米,密集,基部衬有苞叶;苞片线形,略超出花萼,密被绢毛。花萼长约 1.7 毫米,宽约 1 毫米,膜质,外面被疏柔毛,萼齿 5,短小。花冠红色,干后变黑色,为花萼长之 1.5 倍。雄蕊 4,伸出,花丝干后呈黑色,其上毛茸较少。小坚果未见。花期 10 月。

产云南南部;生于水边石上,海拔 800 米。模式标本采自云南景洪。

82. 水蜡烛属 ——**Dysophylla** Bl. ex El-Gazzar et Watson,
emend. nom. conserv.

Bl. ex El-Gazzar et Watson in Taxon **16**: 186—189, 1967.
emend.; Airy Shaw in ibid. **16**: 189—190. 1967——*Alopecuro-veronica* Linn. Amoen. Acad. **4**:143. 1759; Back. et. Bakh. f. Fl. Java **2**:633. 1965, in obs.; H.Keng in Gard. Bull. Singapore **24**:67. 1969, in nota——*Eusteralis* Rafin. in Fl. Tellur. **2**:95. 1836; Bakh. f. et van Steenis in Taxon **17**:235, 236. 1968.

草本植物。茎具通气组织。叶 3—10 枚轮生,无柄,线形至倒披针形,全缘或具疏齿,通常近无毛。轮伞花序多花,在茎或分枝顶部密集组成紧密而连续或极少于基部

图版 79: 1—7. 水珍珠菜 **Pogostemon auricularius** (Linn.) Hassk., 1. 植株上部; 2. 苞片, 正面观; 3. 花, 侧面观; 4. 花萼纵剖, 内面观; 5. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 6. 雌蕊; 7. 小坚果, 背面观。8. 水虎尾 (原变种) **Dysophylla stellata** (Lour.) Benth. var. **stellata**, 8. 植株。(曾孝濂绘)