

有时基部间断；苞片线状披针形，其长几与花冠相等，常带紫色。花萼卵钟形，长1.6—2毫米，外面被疏柔毛及锈色腺点，萼齿5，三角形，长约为萼筒1/2。花冠紫红色，为花萼长之2倍，无毛，冠檐近相等4裂。雄蕊4，极伸出，花丝密被紫红色髯毛。花柱略伸出雄蕊，先端相等2浅裂。花盘平顶。小坚果未见。花期8—10月。

产浙江，安徽，湖南，贵州；生于水池中、水稻田内或湿润空旷地方。日本，朝鲜也有。模式标本采自日本。

7. 线叶水蜡烛

Dysophylla linearis Benth. in DC. Prodr. **12**: 157. 1848; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 639. 1885; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 147. 1915, excl. syn. et specim. Martin; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 48. 1929; 孙雄才, 科学社生物所论文集 **7**: 231. 1932, quoad nom. tantum.

一年生草本。茎高80厘米，基部匍匐，上部上升，具分枝，被锈色腺疏柔毛，基部变无毛。叶4—6枚轮生，线状披针形，长2.5—7.5厘米，宽2—4.5毫米，先端长渐尖，基部无柄，边缘略外卷，全缘或近先端具不明显的疏齿，纸质，上面榄绿色，被微柔毛，下面较淡，肋上被腺短柔毛，其余部分具腺点。穗状花序长约4.5厘米，宽约1.2厘米，连续，仅基部有一轮间断；苞片披针形，与花冠等长或超过之，先端紫红色。花萼狭钟形，长约3毫米，宽约1.6毫米，外面被疏短柔毛，萼齿5，近直立。花冠长约为花萼长1.5倍，外面被微柔毛，冠檐具近相等的4裂片。雄蕊4，长长地伸出，花丝被髯毛。花柱先端2浅裂。花盘平顶。小坚果未见。

产云南西部；生于湿地上。印度也有。模式标本采自印度东北部。

83. 羽萼木属——*Colebrookea* Smith

Smith, Exot. Bot. **2**: 111. 1806.

直立灌木，密被绵状绒毛。叶对生或三叶轮生，大型，长圆状椭圆形，具齿，下面密被绒毛或绵状绒毛。圆锥花序顶生，由穗状分枝组成，具总梗，密被绵状绒毛，穗状分枝由小而密集具10—16花的轮伞花序组成，轮伞花序其下承以多数小苞片；小苞片线形，基部多少连合而呈总苞状。花小，白色，无梗，雌花及两性花异株。花萼钟形，等大，萼筒极短，萼齿5，长锥形，羽毛状，果时延长，呈长刺状，与小坚果连着。花冠细小，雌花冠筒几等于花萼或略超出，两性花冠筒则明显伸出，冠檐多少二唇形，上唇微凹，下唇3裂，中裂片略长。雄蕊4，近等长，分离，在雌花者内藏，在两性花者十分伸出，花丝丝状，无毛，花药近圆形，汇通为一室，其后平铺呈圆形。花盘平顶，全缘。