

网下面隆起；叶柄长为叶片之半至与其近等长，无翅。下部聚伞花序具长约 5 毫米的总梗，比叶短很多，上部聚伞花序无梗，并有时形成顶生长 2.5 厘米无叶小穗状花序。花萼花时长约 1.5 厘米，近相等 5 齿，齿三角形，锐尖，与萼几等长，被微硬绒毛，果萼未见。花冠干时红色(?)，长 3—4 毫米，冠筒内藏，直伸，唇片外被白色小疏柔毛，下唇较长。花柱伸出。(标本未见，摘自原描写)

产云南中部。模式标本采自云南大姚白盐井。

11. 毛萼香茶菜 黑头草(云南通海)，虎尾草(云南丽江)，荷(火)麻根(云南楚雄)，四稜蒿、火地花(云南红河)，沙虫药(贵州兴义)

Rabdosia eriocalyx (Dunn) Hara in Journ. Jap. Bot. **47**(7): 195. 1972——*Plectranthus eriocalyx* Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**: 155. 1913; in ibid. **6**: 141. 1915; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**: 96. 1934; Symb. Sin. **7**: 944. 1936; et in Act. Hort. Göthob. **13**: 365. in clavi, 377. 1939——*Isodon eriocalyx* (Dunn) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 137. 1929——*Plectranthus moslifolius* auct. non Lévl.: Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh **7**: 44, 314. 1912; 384. 1913, quoad Forrest 587.

11a. 毛萼香茶菜(原变种) 图版 92: 5—7

var. **eriocalyx**

多年生草本或灌木，高 0.5—3 米，具匍匐茎。茎钝四棱形，具浅槽，常带紫红色，密被贴生微柔毛。叶对生，卵状椭圆形或卵状披针形，长 2.5—18 厘米，宽 0.8—6.5 厘米，先端渐尖，基部阔楔形或近圆形骤然变狭，下延至叶柄上部，边缘具圆齿状锯齿或牙齿，有时全缘，坚纸质，上面榄绿色，下面较淡，两面脉上及叶柄上被微柔毛；叶柄长 0.6—5 厘米。穗状圆锥花序顶生及腋生，长 2.5—35 厘米，直径约 1 厘米，到处密被白色卷曲短柔毛，由密集多花的聚伞花序组成，聚伞花序具梗，梗长约 2 毫米，花梗较花萼为短；苞片小，线形。花萼花时钟形，长 1.5—1.8 毫米，直径 1.8—2 毫米，最初被灰白色绵毛，以后渐变少毛，萼齿 5，卵形，近相等，长约为花萼长之 1/3，果时花萼直立，增大，长约 4 毫米。花冠淡紫或紫色，长 6—7 毫米，外面被疏柔毛，冠筒基部具浅囊状突起。雌雄蕊内藏，有时花柱略伸出。小坚果卵形，极小，污黄色。花期 7—11 月，果期 11—12 月。

产云南，四川西部，贵州南部，广西西部；生于山坡阳处，灌丛中，海拔 750—2600 米。等模式标本采自四川峨眉山及云南金沙江河谷。

叶治脚气，根止泻止痢。