

产四川西南部,云南西北部;生于林下,海拔 2150—3500 米。模式标本采自四川木里。

50b. 永胜变种

var. yungshengensis C. Y. Wu et H. W. Li, 云南植物志 1: 778. 1976.

这一变种与原变种不同在于叶倒卵形或卵形,长 2.5—6 厘米,宽 1.4—3 厘米,先端急尖,基部深波状渐狭,边缘通常在中部以上每边具 4—7 圆齿状锯齿。

产云南西北部;生于针叶林下,海拔 2600 米。模式标本采自云南永胜。

51. 大理香茶菜 图版 88, 90:12—13

Rabdosia taliensis C. Y. Wu, 云南植物志 1: 777, 图版 184, 12—13. 1976.

小灌木,具直细分枝,幼枝红褐色,钝四棱形,有条纹,密被灰白色短柔毛,老枝褐色,近圆柱形,皮层脱落。茎叶对生,狭菱状卵圆形,长 (2.5) 4—9 厘米,宽 (1) 1.5—3 厘米,先端渐尖或长渐尖,基部楔形下延成具狭翅的假柄,边缘除基部外有整齐的锯齿,坚纸质,上面榄绿色,微具皱,疏被脱落的微柔毛至近无毛,下面灰白色,密被短柔毛,侧脉 4—5 对,与中脉在上面凹陷下面隆起;叶柄本身长 0.5—1 厘米。狭圆锥花序顶生及在上部 1—2 叶腋内腋生,长 2.5—8 厘米,由聚伞花序集合而成,聚伞花序具 3—5 花,具长 2—5 毫米的总梗,有时下部的聚伞花序具 7—9 花,总梗长达 8 毫米,花梗长 4—5 毫米,与总梗及序轴密被灰白色短柔毛;最下部一对苞叶卵状披针形,具锯齿,向上渐变小,狭披针形至卵状披针形,全缘,在花序中下部者均比聚伞花序长许多,在花序上部者比聚伞花序短,苞片及小苞片线形,长不及 1 毫米。花萼钟形,长约 3 毫米,径约 2 毫米,外面在萼筒上密被白色短柔毛,萼齿上仅脉及边缘被白色短柔毛,其余部分被微柔毛,内面无毛,萼齿 5,近等大,三角状披针形,比萼筒长,果时花萼略增大,平伸或略下垂,长 5 毫米,直径 3 毫米,微呈二唇形。花冠长约 9 毫米,冠筒长约 5 毫米,基部后方明显浅囊状,外面与冠檐一样被疏柔毛及腺点,冠檐二唇形,上唇先端具四圆裂,外反,下唇圆卵形,与冠筒近等长。雌雄蕊内藏。成熟小坚果未见。 花期 9 月。

产云南西部。模式标本采自云南大理。

52. 帚状香茶菜 图版 89, 90:10—11

Rabdosia scoparia C. Y. Wu et H. W. Li, 云南植物志 1: 776. 1976.

小灌木,高 0.4—1 米,分枝细而直立;幼枝常带红褐色,四棱形,具浅槽,密被具腺微柔毛,老枝灰褐色,皮层纵向剥落。茎叶对生,近无柄,近圆形至卵状长圆形,长 1.2—1.8 厘米,宽 0.6—1.8 厘米,先端钝至锐尖,基部圆形,近革质,边缘除基部外具锯



