

Symb. Sin. **7**: 942. 1936; in Beih. Bot. Centralbl. **56B** (3): 459. 1937; et in Act Hort. Göthob. **13**: 379. 1939——*Plectranthus striatus* auct. non Benth.: Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 139. 1915, p. p. quoad syn. *Plectranthus gerardianus* Benth et *P. tatei* Hemsl. et specim. Tatci.

这一变种与原变种不同在于植株高大,高 30—150 厘米;叶大,卵形,长达 20 厘米,宽达 8.5 厘米,先端渐尖,基部楔形。

产西藏,云南,四川,甘肃,贵州,广西,广东,湖南;生于杂木林下及灌丛中,海拔 430—2900 米。印度,锡金,尼泊尔,缅甸,泰国,老挝,越南也有。模式标本采自印度北部。

根或全草入药,治急性黄疸型肝炎、急性胆囊炎,并可驱蛔虫。

56c. 细花变种

var. **graciliflora** (Benth.) Hara in Journ. Jap. Bot. **47**(7): 197. 1972——*Plectranthus graciliflorus* Benth. in DC. Prodr. **12**: 56. 1848——*Plectranthus gerardianus* Benth. var. *graciliflorus* (Benth.) Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 618. 1885, excl. syn.——*Plectranthus stritus* Benth. var. *graciliflorus* (Benth.) Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob **13**: 379. 1939——*Plectranthus striatus* auct. non Benth.: Doan in Lecte. Fl. Gén Indo-Chine **4**: 948. 1936, p. p. quoad syn.

这一变种与原变种不同在于茎高 40—100 厘米;叶卵状披针形至披针形,长 5—8.5 厘米,宽 1.5—3.5 厘米,先端渐尖,基部楔形,上面微粗糙至近无毛,下面脉上微粗糙,其余部分满布褐色腺点,干后常带红褐色。

产广东,福建,江西;生于田间或山谷水边。锡金,尼泊尔,印度,缅甸,越南也有。模式标本采自印度北部。

本变种与长叶香茶菜 *Rabdosia stracheyi* (Benth.) Hara 十分相近,但后者以叶狭披针形,茎被栗色串珠状多节短柔毛或鳞秕状短毛而可以与前者区分开。

56d. 小花变种

var. **micrantha** C. Y. Wu, 云南植物志 **1**:774. 1976.

这一变种与原变种不同在于花较小,长 2—3 毫米;叶被极疏具节微硬毛,下面常带紫色。

产云南南部,贵州南部;生于林下、沟边润湿处,海拔 1000—2000 米。模式标本采自云南砚山。

57. 刚毛香茶菜 烂脚丫巴草(云南保山) 图版 103:9