

毛,冠筒长约2毫米,基部上方具极大的浅囊状突起,由于花萼上唇外反而明显露出萼外,上唇长2毫米,宽3毫米,先端具4圆裂,下唇近圆形,长约3毫米,内凹,舟形。雄蕊4,内藏或微露出,花丝扁平,中部以下具髯毛。花柱丝状,先端相等2浅裂。花盘环状。成熟小坚果卵圆状球形,长1.3毫米,淡黄褐色,无毛,具腺点。花期8—9月,果期9—10月。

产四川南部,贵州西北部及东北部;生于开旷山坡,海拔550—2300米。模式标本采自四川南川。

四川峨眉用全草入药,有散寒表汗、清热化痰、消久肿之功。

### 79. 凉山香茶菜

***Rabdosia liangshanica*** C. Y. Wu et H. W. Li in Addenda 590.

多年生草本。茎直立,高0.5—0.8米,钝四棱形,具四浅槽,淡黄褐色,具细条纹,沿棱上密被倒向白色短柔毛。茎叶对生,椭圆形至长圆形,长6—15厘米,宽2.5—4.5厘米,先端长渐尖,基部宽楔形骤然渐狭,下延成长1—3厘米具狭翅的叶柄,边缘为具脐尖尖的圆齿状锯齿,草质,上面绿色,沿肋及脉上密被余部散布小疏柔毛,下面淡绿色,沿肋及脉上略被微柔毛,余部无毛散布淡黄色腺点,侧脉每侧4—5,斜上升至叶缘之内网结,平行细脉在下面明显。圆锥花序顶生及腋生,长10—20厘米,由3—5花的聚伞花序组成,聚伞花序具梗,总梗长2—3毫米,花梗长3—5毫米,与总梗及序轴密被灰白短柔毛;苞叶下部者叶状,无柄,向上变小成苞片状,苞片线形,长达5毫米,小苞片线形,微小,长约2毫米。花萼花时宽钟形,长达4毫米,外被微柔毛,内面无毛,呈3/2式二唇形,裂至1/2以下,上唇3齿,齿三角形,先端长渐尖,下唇2齿,齿长三角形,先端长渐尖,果时花萼下弯,长约6毫米,脉纹明显,上唇3齿,外反,下唇2齿平伸。花冠灰白或微红色,长达10毫米,外被短柔毛,内面无毛,冠筒长约5毫米,基部上方骤然浅囊状,囊大部分常露出萼外,至喉部略收缩,宽约2.5毫米,冠檐二唇形,上唇外反,长3毫米,宽达5毫米,下唇长圆形,长5毫米,宽3毫米,内凹。雄蕊4,微露出,花丝扁平,中部以下具髯毛。花柱丝状,伸出,先端相等2浅裂。花盘环状。成熟小坚果卵球形,长约1.5毫米,褐色,无毛。花、果期8月。

产四川西南部;生于山坡阳处草地上,海拔约2500米。模式标本采自四川普格。

### 80. 大萼香茶菜 图版 93:10

***Rabdosia macrocalyx*** (Dunn) Hara in Journ. Jap. Bot. **47**(7):192. 1972  
——*Plectranthus macrocalyx* Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**:157. 1913; in  
bid. **6**:144. 1915; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Götthob. **13**:368, in clavi, 377. 1939