

下唇狭长,舟状。雄蕊 4,外伸,前对稍长,花丝被粗毛,后对基部具齿状附属器。花柱先端不相等 2 裂。花盘前方呈指状膨大。小坚果长圆形,黑褐色,光滑。花期 10 月至翌年 2 月。

产广西(博白),广东(西南部及海南);生于山坡、路旁、山谷等处,海拔 100—1000 米。泰国,越南及印度尼西亚(苏门答腊、爪哇)间断分布。模式标本采自越南。

广西用花入药,可清肝火,散郁结,治痈肿疮毒、目赤肿痛、瘰癧。

93. 凉粉草属——*Mesona* Bl.

Bl. Bijdr. 838. 1826.

草本,直立或匍匐。叶具柄,边缘具齿。轮伞花序多数,组成顶生总状花序;苞片圆形,卵圆形或披针形,先端尾状突尖,无柄,有时具色泽;花梗细长,被毛。花萼开花时钟形,果时筒状或坛状筒形,具 10 脉及多数横脉,果时其间形成小凹穴,上唇 3 裂,中裂片特大,下唇全缘,偶有微缺。花冠白或淡红色,冠筒极短,喉部极扩大,内面无毛环,冠檐二唇形,上唇宽大,截形或具 4 齿,下唇较长,全缘,舟状。雄蕊 4,斜伸出花冠,花丝分离,后对花丝基部具齿状附属器,花药汇合成 1 室。花柱丝状,超出雄蕊,先端不相等 2 浅裂,裂片钻形。花盘前方呈指状膨大。小坚果长圆形或卵圆形,黑色,光滑或不明显具小疣。

约 8—10 种,星散分布于印度东北部至东南亚及我国东南各省广大地区。我国产 2 种,见于台湾、浙江、江西、广东、广西西部及云南西部。

分 种 检 索 表

1. 叶狭卵圆形至阔卵圆形,长 2—5 厘米,宽 0.8—2.8 厘米,先端急尖或钝,基部急尖、钝或有时圆形,边缘具或浅或深的锯齿,叶柄长 2—15 毫米……………1. 凉粉草 *M. chinensis* Benth.
1. 叶狭椭圆形或卵圆状披针形,长 2—3.5 厘米,宽达 1.5 厘米,先端短渐尖,基部渐狭成短柄,边缘具锐齿,叶柄长 2—5 毫米……………2. 小花凉粉草 *M. parviflora* (Benth.) Briq.

1. 凉粉草(广州植物志) 仙草(植物分类学报 8 卷 1 期),仙人草(广东梅县),仙人冻(本草拾遗),仙人冻、仙草、仙人伴(广东) 图版 116

Mesona chinensis Benth. Fl. Hongk. 274. 1861; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 267. 1890; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**: 207. 1912; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 134. 1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 107. 1929; 侯宽昭, 广州植物志 646. 1956; C. Y. Wu in