

2. 小花凉粉草

Mesona parviflora (Benth.) Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **4**, **3a**: 365. 1897—*Geniosporum parviflorum* Benth. in Wall. Cat. n. 2750. 1830; in Wall. Pl. Asiat. Rar. **2**: 18. 1831; Labiat. Gen. et Sp. 20. 1832—*Mesona wallichiana* Benth. in DC. Prodr. **12**: 46. 1848; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 611. 1885.

草本，直立。茎高达 35 厘米，不分枝，四棱形，被脱落的细刚毛。叶具极短的柄，柄长 2—5 毫米，叶片狭椭圆形或卵圆状披针形，长 2—3.5 厘米，宽达 1.5 厘米，先端短渐尖，基部渐狭成短柄，边缘具锐齿，两面被细刚毛，侧脉 6—7 对，与中脉在上面微凹陷下面稍隆起。轮伞花序多数，在茎顶排成总状花序，此花序长 6—10 厘米，具长 1.5—2.5 厘米的总梗；苞片卵圆形，先端尾状渐尖，无柄；果梗与果萼近等长。花萼果时成坛状筒形，长 4—5 毫米，具有明显的 10 脉及多数横脉，其间形成小凹穴，脉上被细刚毛或渐变无毛，下倾，二唇形，上唇 3 齿，中齿特别宽大，先端急尖，下唇全缘，截形。成熟小坚果未见。

产云南西部。印度东北部也有。模式标本采自印度。

94. 尖头花属——**Acrocephalus** Benth.

Benth. in Bot. Reg. sub t. 1300. 1830; in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. **2**: 1173. 1876; Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **4**, **3a**: 365. 1897.

一年生、稍坚壮草本。叶具短柄，边缘具齿。轮伞花序通常组成顶生圆球形或偶有密集圆柱形的头状花序，个别种由轮伞花序密集成的头状花序不为顶生，而腋生于茎叶腋内且无梗；苞叶 2 或 4，具色泽，苞片多数，覆瓦状排列，明显，稀细小。花小，具梗。花萼花时卵珠形，果时伸长，管状，基部囊状增大，喉部略收缩，二唇形，上唇全缘或具齿，下唇全缘，微凹或具 4 齿，喉部无毛。花冠浅蓝或淡紫色，稀白色，冠筒短，喉部扩大，冠檐近二唇形，上唇短 4 裂，裂片近相等，或较高的 2 裂片靠合，下唇全缘，稍长于上唇，有时冠檐各裂片近于等长。雄蕊 4，下倾，花丝分离，无齿状附属器，插生于花冠喉部，花药卵圆形。花柱先端相等 2 浅裂。花盘前方呈指状膨大。小坚果卵珠形或长圆形，光滑。

约 5—6 种，分布于印度，缅甸，东南亚至印度尼西亚及菲律宾。我国有 1 种，产于云南南部、贵州东南部及广东。原列入本属的许多热带非洲及马达加斯加的种，根据 Morton in Hutch. et Dalz. Fl. W. Trop. Afr. (1963) 的专著已分为许多独立