

1965; H. Keng in Gard. Bull. Singapore **24**:129, f. 24. 1969.

半灌木，高达1米。茎直立，基部木质，近圆柱形，具条纹，有平展的疏柔毛，多分枝。叶长圆形，长2.5—5.5厘米，宽1—3厘米，先端钝，基部楔形至近圆形，边缘具浅波状锯齿，两面被微柔毛及腺点，沿脉上被疏柔毛，侧脉4—6对，与中脉在上面凹陷下面明显，叶柄纤细，长1—2.5厘米，近扁平，被平展疏柔毛。总状花序纤细，长6—8厘米，着生于茎及枝顶，通常于茎顶呈三叉状，在枝顶单一，具长1—1.5厘米的总梗，由多数远离通常具6花的轮伞花序所组成；苞片心形，长宽约1.5毫米，先端骤然短锐尖，基部浅心形，无柄，外面被微柔毛，内面无毛；花梗长约2.5毫米，被微柔毛。花萼钟形，长2.5毫米，外面被柔毛及腺点，内面无毛，萼筒长1.5毫米，萼齿5，呈二唇形，上唇3齿，中齿最大，扁宽卵圆形，先端骤锐尖，边缘稍下延，侧齿宽三角形，比下唇2齿短，先端微刺尖，下唇2齿，齿披针形，先端刺尖，果时花萼增大，长达6毫米、宽4毫米，明显下倾，10脉，横脉显著。花冠白至粉红色，长约3毫米，微超出花萼，外面在唇片略被微柔毛，内面无毛，冠筒长2毫米，喉部增大，冠檐二唇形，上唇宽大，长不及1毫米，宽2.5毫米，4裂，裂片卵圆形，近等大，下唇长圆形，长约1毫米，宽0.6毫米，全缘，扁平。雄蕊4，略伸出花冠外，分离，插生于冠筒近中部，花丝丝状，后对花丝基部具近于消失的微柔毛，花药卵圆形，汇合成一室。花柱超出雄蕊，先端相等2浅裂。花盘平顶，具4齿，齿均短于子房。小坚果卵珠形，长1毫米，宽0.7毫米，褐色，有具腺穴陷，基部有1小白色果脐。花期2、6月，果期3、8月。

产广东海南，台湾，四川；生于干燥沙质草地上。为一泛热带杂草，自北非经西亚，印度，中南半岛，马来西亚，印度尼西亚，菲律宾至澳大利亚也有。模式标本采自印度。

据国外报道全草研粉治头痛，煎服治哮喘，叶可作调味品及代茶用作饮料。

组3. 裸罗勒组——Sect. *Gymnocimum* Benth. Labiat. Gen. et Sp. 12. 1832; et in DC. Prodr. **12**:39. 1848.

花丝全然无毛，离生，无附属器。

5. 台湾罗勒

Ocimum tashiroi Hayata, Icon. Pl. Formos. **8**:109. 1919, nom. nud.; et in ibid. **9**:86. 1920.

茎四棱形，直立，枝纤细，被短柔毛。下部叶未见，上部叶卵圆形，长3厘米，宽2厘米，先端三角状渐尖，基部骤三角形、锐尖、极渐狭至叶柄，除尖头外边缘具锐锯齿，

锯齿三角形,不或几不弯曲,叶片两面近无毛,膜质,叶柄长2厘米。总状花序顶生或在枝条顶端呈圆锥状着生,长5—6厘米,轮伞花序生于总状花序节上,具6—8花,交互对生,具一对苞片;苞片卵圆形,长及宽1毫米,先端有指状锯齿,具长硬毛;花梗长1毫米,具长硬毛。花萼多少下倾,管状钟形,长1.5毫米,宽1毫米,具平展长硬毛及密集的腺点,后中齿大,近圆形,先端锐尖,长2/3毫米,侧齿线形,长约1毫米,边缘具缘毛,前2齿线形,长1毫米,具小缘毛,花萼内面无毛。花冠筒长2毫米,与花萼等长,无毛,宽2/3毫米,冠檐二唇形,上唇3裂,中裂片背面具长硬毛,圆形,侧裂片同形,下唇长圆形,长1毫米,钝,无毛,雄蕊4,二强,较长的花丝长2/3毫米,花药汇合,1室。花盘突出呈一较短于子房的腺体。花柱P状下弯,无毛,先端2裂。小坚果倒卵珠状,无毛。(标本未见,摘自原描写)

产台湾。

98. 鸡脚参属——*Orthosiphon* Benth.

Benth. in Bot. Reg. sub t. 1200. 1830.

多年生草本或半灌木;根通常粗厚,木质。叶近无柄或具柄,具齿。轮伞花序具4—6花,通常具6花,分离,组成延长的总状花序;苞片小,常短于花梗,圆形或扁圆形,全缘;花梗纤细。花萼管形或宽管形,常带艳色,二唇形,上唇宽大,卵形或扁圆形,干膜质,边缘下延至萼筒,果时反折,下唇具4齿,前2齿较2侧齿长,先端均呈芒尖或针状,果时花萼增大,10脉,明显,其间网脉清晰可见。花冠白、浅红至紫色,冠筒伸出,常细弱,直或内弯,向上渐扩展,冠檐二唇形,上唇3—4圆裂,下唇全缘,内凹。雄蕊4,前对较长,下倾,内藏或微伸出,花丝分离,无齿,花药汇合成1室。花柱先端球状,全缘或微凹。花盘前方常呈指状膨大。小坚果卵珠形或近球形,具极小突起,无毛。

约45种,其中约30种产热带非洲,15种左右产东南亚至澳大利亚。我国南部和西南部有2种,2变种。

分种检索表

1. 花冠浅红至紫色;叶卵形,倒卵形或舌状,基生(变种具1—3对茎生叶)
- 1. 鸡脚参 *O. wulfenioides* (Diels) Hand.-Mazz.
1. 花冠白色;叶全部茎生。
2. 叶卵形至阔卵形,长2—5厘米,宽1.2—3.8厘米,先端近急尖,基部楔形或阔楔形..... 2. 石生鸡脚参 *O. marmoritis* (Hance) Dunn