

外面被疏短柔毛,冠筒直,长约1.4厘米,基部宽约2毫米,向上渐宽,至口部宽约4毫米,冠檐二唇形,上唇长约6毫米,宽约8毫米,4裂,下唇长约6毫米,宽约5毫米,全缘,内凹。雄蕊4,内藏,前对稍长,花丝分离,花药汇合成1室。花柱先端头状,微凹。花盘前方呈指状膨大。小坚果球形,直径约2毫米,浅褐色,具极小的突起。花期3—10月,果期6月以后。

产云南东南部、中部、西北部,四川西部、西南部,贵州西南部;生于松林下或草坡上,海拔1200—2900米。模式标本采自云南鹤庆丽江间松林下。

根入药,治消化不良、食积、蛔虫病、风湿痛、虚弱头晕、虚汗、咳嗽,并配方治骨折及脉管炎。

1b. 鸡脚参茎叶变种

var. **foliosus** Stib. in 静生汇报 8:54. 1937.

这一变种与原变种不同在于茎中部有1—3对叶片,基生叶彼此分离,稀呈莲座状,通常较茎生叶小,有时略大,两面被微柔毛至几无毛。

产云南中部,贵州西部,四川西部,广西;生于疏林下或山坡上,海拔833—2300米。模式标本采自云南石屏。

根药用同鸡脚参。

2. 石生鸡脚参 山薄荷、蛇头花(广西),当芽(广西全县)

Orthosiphon marmoritis (Hance) Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 7:154. 1913; in ibid. 6:135. 1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2:115. 1929; Doan in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 4:938. 1936——*Plectranthus marmoritis* Hance in Journ. Bot. Brit. & For. 12:53. 1874; Maxim. in Mém. Biol. Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 9:456. 1877; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26:272. 1890; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 1912:208. 1912——*Orthosiphon sinensis* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26:268. 1890; Dunn et Tutch. in l. c. 207. 1912.

多年生草本。茎直立,具分枝,分枝纤细,茎、枝四棱形,具浅槽及条纹,被腺短硬毛,节间比叶短许多。叶卵形至阔卵形,长2—5厘米,宽1.2—3.8厘米,先端近急尖,基部楔形或阔楔形,边缘具圆齿状锯齿,近基部全缘,纸质,上面榄绿色,下面较淡,两面被短硬毛及金色腺点,侧脉4—5对,弧形,与中脉在两面微隆起,平行网脉下面多少显著;叶柄长1.8—2.8厘米,扁平,被短硬毛。轮伞花序具4—6花,组成疏而纤细的总状花序;苞片小,卵圆形,长2.5毫米,宽1.5毫米,先端短渐尖,具5条纵脉,下面被短硬毛,上面无毛,具小缘毛;花梗细瘦,花时长2.5—3毫米,果时伸长,长达5毫