

将 *P. francheti* 并入 *P. alkekengi*; 哥鲁包夫 (Grubov) 1970 年在《中亚植物》中将 *P. glabripes* 降为变种 *P. alkekengi* var. *glabripes* (Pojark.) Grub., 并将 *P. praetermissa* 取消作为该变种的异名。

我们研究了我国大量的植物材料,该种植物的形态存在着连续的梯度变异,由于长期人工栽培和分布广泛的野生,受生境条件的影响很大。因此,波雅柯娃和赖威依所建立的种都不能成立。对于 *P. bunyardii* 我们同意大井的处理。

应该指出,亚洲东部的类型不同于欧洲及西亚的类型在于花梗仅有稀疏柔毛或近无毛、花萼除檐部毛较密外而筒部毛稀疏,果梗及果萼无毛,而不是象欧洲及西亚的类型那样,果成熟时果梗及果萼的毛亦密生。但在我国确实也有果梗及果萼被柔毛的类型,我们将这一类型定为酸浆,而大量的标本材料是果梗及果萼无毛或近无毛,我们则作为变种,但是,这种区分仍然没有显明的界限。

2. 小酸浆

Physalis minima* L.**, Sp. Pl. 183. 1753; Dunal in DC. Prodr. 13 (1): 445. 1852; C. B. Clarke in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 4: 238. 1883, p. p.; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 174. 1890, p. p.; Merr. in. Lingnan Sci. Journ. 5: 165. 1927, p. p.; Hand.-Mzt., Symb. Sin. 7: 827. 1936——Ph. parviflora* R. Br.**, Prodr. Fl. Nov. Holl. 1: 447. 1810; Dunal, l. c. 455.

一年生草本,根细瘦;主轴短缩,顶端多二歧分枝,分枝披散而卧于地上或斜升,生短柔毛。叶柄细弱,长1—1.5厘米;叶片卵形或卵状披针形,长2—3厘米,宽1—1.5厘米,顶端渐尖,基部歪斜楔形,全缘而波状或有少数粗齿,两面脉上有柔毛。花具细弱的花梗,花梗长约5毫米,生短柔毛;花萼钟状,长2.5—3毫米,外面生短柔毛,裂片三角形,顶端短渐尖,缘毛密;花冠黄色,长约5毫米;花药黄白色,长约1毫米。果梗细瘦,长不及1厘米,俯垂;果萼近球状或卵球状,直径1—1.5厘米;果实球状,直径约6毫米。

产云南、广东、广西及四川。生于海拔1000—1300米的山坡。

3. 苦蕒 (本草纲目) 灯笼泡 (广西); 灯笼草 (华东、广东) 图版 15: 3—4

Physalis angulata* L.**, Sp. Pl. 183. 1753; Ohwi, Fl. Jap. 788. 1965——Ph. esquirolii* Lévl. et Vant.** in Bull. Soc. Bot. France 55: 208. 1908——***Ph. bodinieri* Lévl. et Vant.** l. c.

***Ph. minima* auct. non Linn.**; C. B. Clarke in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 238. 1883, p. p.; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 174. 1890, p. p.;