

米,顶孔略向前;子房卵形,直径不及1毫米,花柱纤细,长约5毫米,柱头头状。浆果圆形,直径约1厘米,成熟后红色;种子肾形,直径约2毫米。花期夏秋间,果熟期秋末。

产东北及青海、新疆(乌鲁木齐)、陕西、河南、河北、江苏、浙江、安徽、湖南、四川、云南、广西、广东诸省。生长于荒坡、山谷、水边、路旁及山崖疏林下,海拔600—1800米,也间有生长在海拔250—2800米的。

15. 海桐叶白英 图版20: 1—2

*Solanum pittosporifolium* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 171. 1890; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 16 (2): 177. 1937.

*S. dulcamara* auct. non L.; Hand.-Mzt. Symb. Sin. 7: 827. 1936, quoad Hand.-Mzt. 12401.

15a. 海桐叶白英(原变种)

var. *pittosporifolium*

无刺蔓生灌木,长达1米,植株光滑无毛,小枝纤细,具棱角。叶互生,披针形至卵圆状披针形,长3.5—10.5厘米,宽1.6—3.5厘米,先端渐尖,基部圆或钝或楔形,有时稍偏斜,全缘,两面均光滑无毛,侧脉每边6—7条,在两面均较明显;叶柄长约0.7—2厘米。聚伞花序腋外生,疏散,总花梗长1—5.5厘米,花梗长约1.1厘米;萼小,浅杯状,直径约3毫米,先端5浅裂,萼齿钝圆;花冠白色,少数为紫色,直径约7—9毫米,花冠筒隐于萼内,长约1毫米,冠檐长5—6毫米,基部具斑点,先端深5裂,裂片长圆状披针形,长约4—5毫米,宽约1.5毫米,中具1脉,边缘被缘毛,开放时向外反折;花丝长约1毫米,光滑,花药长约3毫米,顶孔向内,子房卵形,直径约0.8毫米,花柱丝状,长约7毫米,柱头头状。浆果球状,成熟后红色,直径约0.8—1.2厘米;种子多数,扁平,直径约2—2.5毫米。花期6—8月,果期9—12月。

星散分布于河北、安徽、浙江、江西、湖南、四川、贵州、云南、广西、广东诸省。生长于密林或疏林下,海拔500—2500米。

15b. 疏毛海桐叶白英(变种)


var. *pilosum* C. Y. Wu et S. C. Huang, 植物分类学报, 16(2): 72. 1978.

与海桐叶白英的区别在于植株被疏柔毛,茎之棱角不显著。

产云南(维西、立地坪)。见于杂木林中,海拔2500米。

16. 台白英

*Solanum hidetaroii* Masamune in Trans. Not. Hist. Formos. 29: 84.



图版 20: 1—2. 海桐叶白英 *Solanum pitosporifolium* Hemsl., 1. 花果枝; 2. 叶背面一部分放大示无毛。 3—4. 欧白英 *S. dulcamara* L., 3. 果枝; 4. 叶背面一部分放大示毛被。 5—7. 千年不烂心 *S. cathayanum* C. Y. Wu et S. C. Huang, 5. 花枝; 6. 叶背面一部分放大示毛被; 7. 叶上面毛放大。(曾孝濂绘)