

米,顶孔略向前;子房卵形,直径不及1毫米,花柱纤细,长约5毫米,柱头头状。浆果圆形,直径约1厘米,成熟后红色;种子肾形,直径约2毫米。花期夏秋间,果熟期秋末。

产东北及青海、新疆(乌鲁木齐)、陕西、河南、河北、江苏、浙江、安徽、湖南、四川、云南、广西、广东诸省。生长于荒坡、山谷、水边、路旁及山崖疏林下,海拔600—1800米,也间有生长在海拔250—2800米的。

15. 海桐叶白英 图版20: 1—2

Solanum pittosporifolium Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 171. 1890; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 16 (2): 177. 1937.

S. dulcamara auct. non L.; Hand.-Mzt. Symb. Sin. 7: 827. 1936, quoad Hand.-Mzt. 12401.

15a. 海桐叶白英(原变种)

var. *pittosporifolium*

无刺蔓生灌木,长达1米,植株光滑无毛,小枝纤细,具棱角。叶互生,披针形至卵圆状披针形,长3.5—10.5厘米,宽1.6—3.5厘米,先端渐尖,基部圆或钝或楔形,有时稍偏斜,全缘,两面均光滑无毛,侧脉每边6—7条,在两面均较明显;叶柄长约0.7—2厘米。聚伞花序腋外生,疏散,总花梗长1—5.5厘米,花梗长约1.1厘米;萼小,浅杯状,直径约3毫米,先端5浅裂,萼齿钝圆;花冠白色,少数为紫色,直径约7—9毫米,花冠筒隐于萼内,长约1毫米,冠檐长5—6毫米,基部具斑点,先端深5裂,裂片长圆状披针形,长约4—5毫米,宽约1.5毫米,中具1脉,边缘被缘毛,开放时向外反折;花丝长约1毫米,光滑,花药长约3毫米,顶孔向内,子房卵形,直径约0.8毫米,花柱丝状,长约7毫米,柱头头状。浆果球状,成熟后红色,直径约0.8—1.2厘米;种子多数,扁平,直径约2—2.5毫米。花期6—8月,果期9—12月。

星散分布于河北、安徽、浙江、江西、湖南、四川、贵州、云南、广西、广东诸省。生长于密林或疏林下,海拔500—2500米。

15b. 疏毛海桐叶白英(变种)

var. *pilosum* C. Y. Wu et S. C. Huang, 植物分类学报, 16(2): 72. 1978.

与海桐叶白英的区别在于植株被疏柔毛,茎之棱角不显著。

产云南(维西、立地坪)。见于杂木林中,海拔2500米。

16. 台白英

Solanum hidetaroii Masamune in Trans. Not. Hist. Formos. 29: 84.

1939.——*S. morrisonense* Hayata, Gen. Ind. Fl. Form. 52: 1917; Sasaki, List Pl. Form. 364. 1928, et Cat. Governm. Herb. 451. 1930, nom. nud., fide photo. Y. Tsiang Herb. 23180.

草本，茎中空，外面具棱角，近无毛或具微柔毛。叶卵状披针形，茎下部叶与茎端及小枝的叶的大小悬殊极大，茎下部叶长3—5厘米，宽1—2.4厘米，先端渐尖，基部圆形稍偏斜，边全缘或啮蚀状，上面被具节的微柔毛，下面近于无毛，侧脉每边7—8条；叶柄纤细，长约0.8—1.2厘米，被微柔毛；茎端及小枝的叶小，长约1.5—1.8厘米，宽约6毫米，其他特征与茎下部叶相同。聚伞花序腋外生，疏散，总花梗长约2厘米，被微柔毛，花梗长约1厘米，无毛，萼杯状，直径约2.5毫米，5浅裂，萼齿卵圆形具凸尖，外面具分散的微柔毛；花冠筒隐于萼内，长约0.8毫米，冠檐长约4毫米，5深裂，裂片披针形，长约3毫米，宽约1.3毫米，基部具2斑点，外面边缘及先端被短柔毛；花丝长约0.6毫米，花药长2毫米，宽约0.5毫米，顶孔向内；子房卵形，无毛，直径约1毫米，花柱纤细，长约4毫米，柱头头状，有时弯向下。浆果球状，直径约5—6毫米，具有向外开张的宿萼，果柄长约1.2—1.5厘米，上端稍膨大；种子近圆形，两侧压扁，直径约1.5毫米。

仅见于我国台湾省。

组6. 青杞组

Sect. 6. *Polybotryon* (Dunal) Bitter in Fedde Repert. 11: 10, 469. 1912.——Sect. I. *Pachystemonum* Dunal Subsect. III. *Dulcamara* Dunal * * *Polybotryon* Dunal in DC. Prodr. 13 (1): 28, 66. 1852.——Subg. I. *Eusolanum* Bitter Sect. 2. *Dulcamara* (Dunal) Bitter Ser. 2. *Septemloba* Pojark. in Schischk. Fl. URSS 22: 11. 1955.

聚伞花序总状，近腋生，丛生，多花或单花，有时对叶生。花冠五角形，折叠状，5深裂或5半裂，青紫色或白色。果圆形及卵圆形。叶奇数羽状分裂，裂片全缘，常渐尖或简单不裂。中南美约30余种。我国有3种。

17. 南青杞 玲珑茄(云南西双版纳勐仑) 图版22: 1

Solanum kerrii Bonati in Bull. Soc. Bot. Gèneve, ser. 2. 5: 310. 1913, et in Lecte. Fl. Gén. L'Indo-Chine 4: 317. 1915.

S. seaforthianum auct. non Andr.; Craib. in Contr. Fl. Siam. Dicotyl. 143. 1911; 侯宽昭等，广州植物志，573. 1956.