

毫米,柱头头状,绿色。浆果近球状,熟时红色,直径约8毫米;种子扁圆形,径约2—3毫米。花期夏秋间,果熟期秋末冬初。

产新疆、甘肃、内蒙古、东北、河北、山西、陕西、山东、河南、安徽、江苏及四川诸省。喜生长于山坡向阳处,海拔900—1600米,也有分布在300—2500米的。

18b. 卵果青杞(变种)

var. *ovoidocarpum* C.Y. Wu et S. C. Huang, 植物分类学报, 16(2): 72. 1978.

本变种与青杞的区别在于果为卵形。叶3—5裂或近全缘。产河北、内蒙。

18c. 单叶青杞(变种)

var. *subintegrifolium* C. Y. Wu et S. C. Huang, l. c. 73. 1978.

本变种与青杞的区别在于叶不羽状分裂,少数边缘具不规则的齿裂。

产河北、河南、山西、陕西、甘肃,海拔620—900米。

18d. 茄子蒿 图版22: 2—4

var. *indutum* Hand.-Mzt. in Oest. Bot. Zoitschr. 83 (3): 234. 1934.

本变种与青杞的区别在于植株全部(花除外)密被不等长透明而伸张的腺毛;叶一般较小。

产河北、河南、陕西、甘肃、四川。生于村边荒地及田边路旁,海拔930—3100米。

组7. 阳芋组

Sect. 7. *Tuberarium* (Dunal) Bitter in Fedde Repert. 10: 531. 1911; ibid. 11: 350. 1912, sensu stricto. excl. spp. Sect. *Basathrum* Bitter, et in Engl. Bot. Jahrb. 54: 499. 1917, et in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Europ. 5(4): 2584. 1927; Correll, Sect. Tuber. Gen. Solan. 18. 1952; Pojark. in Schischk. Fl. URSS 22: 8. 1955.——Sect. I. *Pachystemonum* Dunal Subsect. I. *Tuberarium* Dunal in DC. Prodr. 13 (1): 28, 31. 1852, cum\* *Potatoe*; Wettst. in Engl. et Pr., Pflzfam. 4, 3b: 22. 1891.——*Solanopris* Börner, Abh. Naturf. Ver. Bremen 21: 282. 1912, p. p.

花序初时近顶生,稍后侧生,腋外生,与叶远离。花柄基部具关节或多半在基部以上,有时在中部,稍稍在萼下具关节。花冠大多白色或青紫色,极稀黄色,展开,常辐形(裂片几直达顶部以花瓣间膜相连合),然亦常多少星形(裂片间膜仅以较下部至中部相连合),多半大或中等大,稀小。花丝几永远分离;花药永远分离,披针形或椭