

地,在干燥灌丛中有时成片生长。广布于热带印度、缅甸、中南半岛,南至马来半岛,东至菲律宾。

果能治咳嗽及伤风,内服可用于难产及牙痛,亦用于治发烧,寄生虫及疝痛,外擦可治皮肤病,叶汁和新鲜姜汁可以止吐,叶及果和籽磨碎可治癣疥。果皮中含龙葵碱。

24b. 弯柄刺天茄(变种)

var. *recurvatum* C. Y. Wu et S. C. Huang, 植物分类学报, 16 (2):73. 1978.

本变种与刺天茄的区别在于叶上面被不等长分枝的星状柔毛,花冠不作辐状5深裂;花药长圆形;果柄短而向下弯。

产云南河口、思茅、勐海。

25. 苦刺(西畴) 图版 25: 3—5

*Solanum deflexicarpum* C. Y. Wu et S. C. Huang, l. c. 73. 1978.

直立小灌木,高1米左右,小枝,叶柄,叶下面及花序均被有(3)—5—9不等长分枝的具短柄或无柄的星状绒毛,正中的一分枝稍长。小枝棕褐色,间或具1—2个长不及1毫米的小皮刺,嫩枝的毛被较小枝为密。叶卵形,双生(其中之一往往较小),长5.5—10.5厘米,宽4—8.5厘米,先端锐尖,基部截形,宽楔形至两侧不等称,边缘5—7浅裂,裂片钝,上面绿色疏被3—5—(9)不等长分枝的星状绒毛,正中的一分枝较长,下面黄绿色,毛被较上面密,中脉在两面均密被星状毛,侧脉每边3—4条;叶柄长1.5—2.5厘米。蝎尾状花序腋外生,长约2厘米,无总花梗,花序轴长1.5—1.8厘米,具花10—11朵,花梗长约4—5毫米;花白色,直径约1.5厘米,萼钟形,长约4毫米,外面被星状毛,5裂,裂片卵形,长约1.5毫米,端急尖;花冠钟形,长约1厘米,冠檐长约7毫米,先端5深裂,裂片卵状披针形,长约5毫米,外面及内面上部均被星状毛,花冠筒长2毫米,隐于萼内;花丝短,长不及1毫米,花药黄色,长圆形,长约4毫米,顶孔向上;子房近卵形,顶端被星状毛,花柱纤细,长约7毫米,除顶端外几全部被星状绒毛,柱头无毛。果序长约3厘米,毛被或多或少脱落,上部的花多败育,下部具成熟果4—5枚,果柄长约1厘米,花后向下弯曲,浆果球状,光亮,直径约1厘米,具宿存萼;种子盘状,暗黄色,直径约2毫米。花期秋季,花后随即结果。

产云南西畴的香屏山,海拔1500米,路旁。

26. 雪山茄 图版 25: 1—2

*Solanum nivolo-montanum* C. Y. Wu et S. C. Huang, l. c. 74. 1978.

直立小灌木,高约0.5—0.7米;小枝,叶下面,叶柄及花序均被5—9分枝具长柄及短柄的星状绒毛,小枝深褐色,毛被在幼时密,渐老逐渐脱落,具皮刺,皮刺土黄色,