

6. 顺宁红丝线 图版 31: 1—2

Lycianthes shunningensis C. Y. Wu et S. C. Huang l. c. 77. 1978.

灌木, 高 1.5—2.5 米, 小枝上部廻折, 幼时被疏柔毛, 后逐渐脱落几近于光滑。大叶片长圆形, 偏斜, 长 6—17 厘米, 宽 2.8—7.4 厘米, 叶柄长约 0.5—2 厘米; 小叶片卵形, 偏斜, 长 2—7.5 厘米, 宽 1.5—5.5 厘米; 叶柄长约 1—10 毫米, 两种叶均在上面被具节的疏柔毛, 在边缘具缘毛, 下面沿脉上疏被微柔毛。花序无柄, 4—6 花着生于叶腋内, 花梗长约 7—10 毫米, 初具疏柔毛, 后逐渐光滑, 萼杯状, 连合部分长 3 毫米, 直径约 4 毫米, 萼齿 10 枚, 钻状线形, 稍不相等, 约长 2—3—(4—5) 毫米, 常向四周伸张。花冠紫蓝色, 直径约 1.5 厘米, 冠檐长约 8 毫米, 基部具深色斑点, 顶端 5 裂, 裂片披针形, 约长 7 毫米, 宽 1.5—2 毫米, 在外面先端被微柔毛, 花冠筒长约 1.5 毫米; 花药长圆形, 约长 4 毫米, 宽 1 毫米, 疏被白色微柔毛, 花丝长约 0.4 毫米。果未见。花期 7 月。

产云南, 生长于丛林中, 海拔 2280 米。

7. 麻栗坡红丝线 图版 32: 1

Lycianthes marlipoensis C. Y. Wu et S. C. Huang, l. c. 78. 1978.

亚灌木, 高 1—2 米, 植株全部无毛。较上部叶假双生, 大小不相等, 厚纸质, 大叶片长椭圆形, 偏斜, 长 10.5—14 厘米, 宽 4—5.5 厘米, 先端尾状渐尖或镰形, 基部楔形, 边全缘, 上面绿色, 下面淡绿色, 侧脉每边 4—6 条, 在叶下面凸出, 叶柄粗壮, 长 1—1.5 厘米; 小叶片卵状披针形, 偏斜, 长 3.8—8.5 厘米, 宽 1.7—3.5 厘米, 先端尾状渐尖, 基部宽楔形, 全缘, 叶柄长约 5—12 毫米。花未见。果序无柄, 通常 2—4—(6—8) 果着生于叶腋内, 果柄通常长 2—3 厘米, 下部较纤细。浆果绿色(未成熟), 球状, 直径约 6 毫米, 宿萼浅杯状, 长约 3 毫米, 直径约 5 毫米, 边截形, 萼齿 5 枚, 突起于杯状萼截形边缘的下面, 稍不等长, 约长 0.5—1 毫米, 先端瘤状凸起或稍弯, 基部三角形。种子多数, 褐黄色, 近三角形, 约长 1.5—2 毫米, 宽 1—1.2 毫米, 水平压扁。果期冬季。

产云南东南部。生长于林下或石灰岩山地, 海拔 1100—1600 米。

8. 截萼红丝线 图版 33: 4—6

Lycianthes subtruncata (Wall.) Bitter in Abh. Naturw. Ver. Bremen 25: 478. 1919.——*Solanum subtruncatum* Wall., Catal. n. 2620. 1828; Dunal in DC. Prodr. 13 (1): 180. 1852; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 231. 1883.——*S. neesianum* Wall., Catal. Suppl. n. 248; Nees in Trans. Linn. Soc. 17: 42. 1832—37; G. Don., Syst. 4: 420. 1838; Walp., Rept. 3: 62. 1844—45; Dunal in DC. Prodr. 13 (1): 174. 1852.



图版 33: 1—3. 滇红丝线 *L. yunnanensis* (Bitter) C. Y. Wu et S. C. Huang, 1. 果枝; 2. 叶面一部分放大; 3. 茎一部分放大。4—6. 截萼红丝线 *L. subtruncata* (Wall.) Bitter, 4. 果枝; 5. 叶面一部分放大; 6. 茎一部分放大。(李锡畴绘)