

原产南美洲。我国有栽培。

2. 黄花烟草(农艺植物考源) 小花烟(陕西);山菸(山西)。

Nicotiana rustica L. Sp. pl. 180. 1753; T. H. Goodspeed, Gen. Nicot. 356. 1954; 侯宽昭等, 广州植物志, 580. 1956. ——*N. rugosa* Mill., Gard. Dict. ed. 8. n. 7. 1768.

一年生草本, 高40—60厘米、有时达120厘米。茎直立, 粗壮, 生腺毛, 分枝较细弱。叶生腺毛, 叶片卵形、矩圆形、心脏形、有时近圆形或矩圆状披针形, 顶端钝或急尖, 基部圆或心形偏斜, 长10—30厘米, 叶柄常短于叶片之半。花序圆锥式, 顶生, 疏散或紧缩; 花梗长3—7毫米。花萼杯状, 长7—12毫米, 裂片宽三角形, 1枚显著长; 花冠黄绿色, 筒部长1.2—2厘米, 檐部宽约4毫米, 裂片短, 宽而钝; 雄蕊4枚较长, 1枚显著短。蒴果矩圆状卵形或近球状, 长约10—16毫米。种子矩圆形, 长约1毫米, 通常褐色。花期7—8月。

原产南美洲。我国西南、西北部及山西、广东等省有栽培。作烟草工业的原料; 全株也作农药杀虫剂。

3. 烟草(食用本草) 烟叶(北方) 图版39

Nicotiana tabacum L., Sp. Pl. 180. 1753 ——*N. chinensis* Fisch. ex Lehm., Gen. Nicot. 18. 1818; Dunal in DC. Prodr. 13 (1): 559. 1852.

一年生或有限多年生草本, 全体被腺毛; 根粗壮。茎高0.7—2米, 基部稍木质化。叶矩圆状披针形、披针形、矩圆形或卵形, 顶端渐尖, 基部渐狭至茎成耳状而半抱茎, 长10—30(—70)厘米, 宽8—15(—30)厘米, 柄不明显或成翅状柄。花序顶生, 圆锥状, 多花; 花梗长5—20毫米。花萼筒状或筒状钟形, 长20—25毫米, 裂片三角状披针形, 长短不等; 花冠漏斗状, 淡红色, 筒部色更淡, 稍弓曲, 长3.5—5厘米, 檐部宽1—1.5厘米, 裂片急尖; 雄蕊中1枚显著较其余4枚短, 不伸出花冠喉部, 花丝基部有毛。蒴果卵状或矩圆状, 长约等于宿存萼。种子圆形或宽矩圆形, 径约0.5毫米, 褐色。夏秋季开花结果。

原产南美洲。我国南北各省区广为栽培。作烟草工业的原料; 全株也可作农药杀虫剂; 亦可药用, 作麻醉、发汗、镇静和催吐剂。

4. 花烟草

Nicotiana alata Link et Otto, Ic. Pl. Rar. Hort. Reg. Bot. Berol. 1: 63, t. 32. 1828 ——*N. alata* Link et Otto var. *grandiflora* Comes, Monogr. Nicot. 37. 1881.

有限的多年生草本，高 0.6—1.5 米，全体被粘毛。叶在茎下部铲形或矩圆形，基部稍抱茎或具翅状柄，向上成卵形或卵状矩圆形，近无柄或基部具耳，接近花序即成披针形。花序为假总状式，疏散生几朵花；花梗长 5—20 毫米。花萼杯状或钟状，长 15—25 毫米，裂片钻状针形，不等长；花冠淡绿色，筒长 5—10 厘米，筒部直径约 3—4 毫米，喉部直径约 6—8 毫米，檐部宽 15—25 毫米，裂片卵形，短尖，2 枚较其余 3 枚为长；雄蕊不等长，其中 1 枚较短。蒴果卵球状，长 12—17 毫米。种子长约 0.7 毫米，灰褐色。

原产阿根廷和巴西。我国哈尔滨、北京、南京等市有引种栽培。

24. 碧冬茄属 —— *Petunia* Juss.

Juss., in Ann. Mus. Par. 2: 915. t. 74. 1803.

草木，常常有腺毛，分枝。叶全缘，互生。花单生。花萼 5 深裂或几乎全裂，裂片矩圆形或条形；花冠漏斗状或高脚碟状，筒部圆柱状或向上渐扩大，檐部有折襞，对称或偏斜而稍 2 唇形，裂片短而阔，覆瓦状排列；雄蕊 5，插生于花冠筒中部或下部，不伸出花冠，其中 4 枚强，第 5 枚短、稀不育或退化，花丝丝状，花药纵缝裂开；花盘腺质，全缘或缺刻状 2 裂；子房 2 室，柱头不明显 2 裂，胚珠多数。蒴果 2 瓣裂。种子近球形或卵球形，表面布网纹状凹穴；胚稍弓曲或近直。

约 25 种，主要分布于南美洲。我国普遍栽培 1 种。

1. 碧冬茄 图版 40: 1—5

Petunia hybrida Vilm., Fl. Pl. Terre ed. 1. 616.; 侯宽昭等, 广州植物志, 580. 1956.

[*P. integrifolia* (Hook.) Schinz et Thell X *P. axillaris* (Lam.) Britton]

一年生草本，高 30—60 厘米，全体生腺毛。叶有短柄或近无柄，卵形，顶端急尖，基部阔楔形或楔形，全缘，长 3—8 厘米，宽 1.5—4.5 厘米，侧脉不显著，每边 5—7 条。花单生于叶腋，花梗长 3—5 厘米。花萼 5 深裂，裂片条形，长 1—1.5 厘米，宽约 3.5 毫米，顶端钝，果时宿存；花冠白色或紫堇色，有各式条纹，漏斗状，长 5—7 厘米，筒部向上渐扩大，檐部开展，有折襞，5 浅裂；雄蕊 4 长 1 短；花柱稍超过雄蕊。蒴果圆锥状，长约 1 厘米，2 瓣裂，各裂瓣顶端又 2 浅裂。种子极小，近球形，直径约 0.5 毫米，褐色。