

棒状退化雄蕊；柱头 2 浅裂。蒴果球形，棕褐色，直径 4—5 毫米；种子细长，具网纹。花果期 5—7 月。

分布于东北、江苏、江西、云南。朝鲜，日本及苏联远东地区也有。生稻田及水边带粘性的淤泥上。

2. 黄花水八角

Gratiola griffithii Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 273. 1885; Merr. Lingn. Sci. Journ. 13: 71. 1934.

平卧草本。根须状。茎叶肉质，茎从基部多分枝，分枝长 10—13 厘米，粗壮。叶对生，基部抱茎，椭圆状矩圆形，长 15—20 毫米，宽 5—11 毫米，顶端钝，主脉三条，背面有黑色小斑点。花腋生，花梗极短，长约 1 毫米；小苞片 2 枚，卵形；花萼长约 3.5 毫米，5 深裂，萼裂片披针形，宿存；花冠黄色或带白色，长约 6 毫米，当中稍收缩，花冠筒与唇部近等长，长约 3 毫米，上唇边缘不规则齿缺，下唇 3 裂；雄蕊 2 枚，内藏，花丝插生于花冠筒上，长 1.5 毫米，花药 2 室，平行，无退化雄蕊；子房卵形，长 1.5 毫米，花柱长 1.8 毫米，柱头膨大。蒴果球形，直径 2.5—3 毫米，顶端有小尖头。

分布于广东。热带及亚热带地区。生于湿地上。

10. 蛇眼属——*Dopatricum* Buch.-Ham. ex Benth.

Buch.-Ham. ex Benth., Scroph. Ind. 30. 1835.

一年生稍带肉质的纤弱草本，直立，简单或有分枝，有时倾卧。叶对生，全缘，肉质，有时退化为鳞片状，上部者常小。花腋生单出，无梗或有梗，无小苞。萼 5 深裂；花管超出萼很多，向上扩大，瓣片二唇状，其 2 裂的上唇显著短于 3 裂而伸展的下唇；能育雄蕊 2 枚，处于后方，着生于花管，有丝状的花丝，药室并行，分离而相等，退化雄蕊 2 枚处于前方，小而全缘，生于管内；花柱短，顶端具 2 片状的柱头，或棍棒状或头状；胚珠各室多数。蒴果小，球形或卵圆形，室背开裂，其片全缘或顶部稍稍二浅裂，中部有隔障，生有膨大的胎座；种子细小多数，有节结或略有网脉。

本属约有 10 种，分布于非洲、亚洲和大洋洲的热带地区，我国仅有 1 种。

1. 蛇眼 图 35

Dopatricum junceum (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth. Scroph. Ind. 31. 1835, et in DC. Prodr. 10: 407. 1846; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 274. 1885; Bonati, in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 4: 360. 1927; 广州植物志 603. 1956; 海南植物志 3: 499. 图 883. 1974; 中国高等植物图鉴 4: 24. 图 5462. 1975.