

—2500 米的路旁、河边或干山坡上。

2. 大花钟萼草

Lindenbergia grandiflora Benth. Scroph. Ind. 22. 1835; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 261. 1885. et Curtis Bot. Mag. 126: t. 7738. 1900; 中国高等植物图鉴 4: 20. 1975.——*Stemodia grandiflora* Buch.-Ham. in Don Prodr. Fl. Nep. 89. 1825.

多枝半攀援一年生草本，多长毛，有时茎基部木质化；枝细而弯曲，长达 15—80 厘米。叶对生于茎同枝上，下部者长达 20 厘米，上部的较小很多，均为卵形，锐头或锐尖头，有波状锯齿，浅绿色，有脉 6—10 对，有柄，下部叶的柄长可达 7 厘米。花微偏向一面，几无梗，单生于苞腋中，集成长而疏的有叶穗状花序，有时长达 25 厘米；萼钟形，长约 7—8 毫米，有长腺毛，萼齿相等，伸展，圆形；花冠筒较萼长 2—3 倍，有疏毛，金黄色，上唇短而圆，端有凹缺，下唇宽过于长，宽达 2.5 厘米，3 裂，侧裂片短矩圆形，中裂片较小，圆形，有凹头，喉部有 2 条矩圆形并行的褶襞，上有红点；花丝中部以下有毛，药室歪斜地叠置，矩圆形；子房有绢毛。蒴果卵圆形，仅顶端伸出宿萼之外。

分布于西藏南部；喜马拉雅南坡亚热带地区也有。

3. 钟萼草 图 37

Lindenbergia philippensis (Cham.) Benth., Scroph Ind. 22. 1835. et in DC. Prodr. 10: 377. 1846; Bonati, in Lecomte Fl. Gén. Indo-Chine 4: 363. t. 42. f. 10—14. 1927; 广州植物志 595 页. 1956; 中国高等植物图鉴 4: 20. 图 5453. 1975.——*Stemodia* sp., Griff. Notul. 4: 99. et IC. Pl. Asiat. t. 421.——*L. melvillei* Sp. Moore, Journ. Bot. 43: 144. 1905.——*L. philippensis* Benth. var. *ramosissima* Bonati in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 4: 363. 1927.

多年生粗壮、坚挺、直立、灌木状草本，高可达 1 米，全体被多细胞腺毛。茎圆柱形，下部木质化，多分枝。叶多，叶柄长 6—12 毫米，叶片卵形至卵状披针形，纸质，长 2—8 厘米，端急尖或渐尖，基部狭楔形，边缘具尖锯齿。花近于无梗，集成顶生稠密的穗状总状花序，长 6—20 厘米，仅基部有间断；苞片狭披针形，较萼稍短；花萼长 5—6 毫米，主脉 5 条明显，萼齿尖锐，钻状三角形，与萼筒等长；花冠黄色，外面带紫斑，多少被毛，花冠筒较花萼约长 1 倍，上唇顶端近于截形，有时有凹缺，下唇较长，有明显的褶襞，花药有长药隔，具柄；子房顶端及花柱基部被毛。蒴果长卵形，长约 5—6