

10 朵;苞片小,钻形;花梗长者达 25 毫米,有白色绢毛;萼长 5—7 毫米,仅基部联合,齿 5,条状披针形,有白色绢毛;花冠紫色或黄白色,长 8—10 毫米,上唇直立,2 浅裂,下唇开展,3 裂;雄蕊 4,全育,前方 2 枚的花丝基部附属物齿状;柱头 2 裂。蒴果长卵圆形,比宿萼短;种子有格状瘤点。花期 7—10 月,果期 9—11 月。

分布于云南南部、广东、广西、福建、江西南部等省。印度至印度尼西亚也有分布。喜生于海拔 900—1400 米的荒芜田野、阳山坡、山谷灌丛、林边、水流旁等环境中。

组 5. 刺毛组——Sect. *Setulosae* (Yamaz.) Philcox, Kew Bull. 22: 31. 1968.——*Vandellia* sect. *Tittmannia* Ser. *Setulosae* Yamaz. Journ. Jap. Bot. 30: 174. 1955.

萼仅基部联合,齿 5;雄蕊 4,全育,前方一对花丝基部附属物丝状或棍棒状。蒴果椭圆形至卵状矩圆形,与萼近等长或稍短。

本组在我国仅有下列 6 种。

10. 蓴麻叶母草

Lindernia urticifolia (Hance) Bonati, in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine 4: 421. 1912; Philcox, Kew Bull. 22: 31. p. 5. f. 9—12. 1968.——*Vandellia urticifolia* Hance Journ. Bot. 6: 301. 1868; Yamaz. Journ. Jap. Bot. 30: 174. 1955; Li, Quart. Journ. Taiwan Museum 14: 5. 1961.

一年生直立草本,高可达 40 厘米,常多分枝,老时基部木质化,茎枝方形,有明显的棱,被伸展的长硬毛。叶柄长者可达 14 毫米;叶片三角状卵形,长 1.2—2 厘米,宽几相等,顶端急尖,基部宽楔形至截形,常下延于叶柄而成狭翅,缘每边有 4—6 枚锐锯齿,两面被伸展的长硬毛。花数多,多成腋生总状花序,再集成圆锥花序;花梗长 2—7 毫米,有毛;苞片狭披针形,被毛;萼长 3 毫米,仅基部联合,齿 5,条状披针形,疏被伸展的毛,中脉明显;花冠小,长约 4 毫米,紫色,紫红色或蓝色,仅稍长于萼齿;花管长约 1 毫米,中部膨大,上唇有浅缺,下唇较长 1 倍,3 裂;雄蕊 4,全育,前方一对有头部膨大的棍棒状附属物。蒴果椭圆形,比宿萼短;种子多数,有菱。花期 7—10,果期 9—11 月。

分布于广东、广西、云南、福建。越南,马来半岛和加里曼丹也有分布。生于稻田、草地和山腰沙质土壤中。

11. 长序母草

Lindernia macrobotrys Tsoong, sp. nov., in Addenda 396.