

相等或不等的2片状。蒴果被包于宿存的花萼内或伸出,形状同质地多样,革质、软骨质、膜质或纸质,2裂;种子多数而小,通常为卵圆形或长圆形,种皮光滑或具网纹。

本属约150种,广布于全球,以美洲西北部最多。我国有5种,主要产于西南各省。

分 种 检 索 表

1. 花具2枚线状小苞片。
 2. 叶长圆状倒卵形至匙状倒披针形(四川西部)……………1. **小苞沟酸浆** *M. bracteosa* Tsoong
 2. 叶狭窄成柳叶状(四川西部)……………**柳叶沟酸浆** *M. bracteosa* Tsoong forma *salicifolia* Tsoong
1. 花不具小苞片。
 3. 植株小,匍匐;茎平卧或斜倚;叶在茎中上部的常基部近心脏形,无柄而抱茎;花梗细弱常较叶长(云南西南部)……………2. **匍生沟酸浆** *M. bodinieri* Vant
 3. 植株较大;茎直立或铺散状,有时着地部分亦长不定根;叶在茎中上部的基部截形、楔形或近圆形,无柄或有柄;花梗常较叶短。
 4. 叶圆形,常有重锯齿,顶端及基部近圆形,茎中上部的无柄;花萼宽钟状,萼口平截,除后方的1枚齿较大外,其余齿极宽而短,长不到1毫米(西藏)……………3. **西藏沟酸浆** *M. tibeticus* Tsoong et Yang
 4. 叶卵形、卵状三角形至矩圆形,边缘无重锯齿,顶端有尖头,基部截形或楔形,茎中上部的有柄或近于无柄;花萼圆筒形或宽钟形,萼口平截或斜形,萼齿较长而窄,长超出1毫米。
 5. 花萼圆筒形,萼口斜截,萼齿长短不齐,后方的1枚较大;茎直立,有翅(西南、甘肃、陕西、湖北、湖南)……………4. **四川沟酸浆** *M. szechuanensis* Pai
 5. 花萼圆筒形或宽钟形,萼口平截或稍斜,萼齿短而齐或后方的1枚较大;茎直立或铺散状,有翅或无翅。
 6. 花萼圆筒形,萼口平截,萼齿短而齐;茎铺散状或近直立,有翅。
 7. 茎常铺散状;花梗与叶柄近等长,明显的较叶短;花萼小,长约5毫米(秦岭淮河以北,陕西以东各省)……………5. **沟酸浆** *M. tenellus* Bunge var. *tenellus*
 7. 茎常近直立;花梗与叶近等长;花萼较大,长1厘米或更长(秦岭淮河以南,两广、福建以外各省区)……………**尼泊尔沟酸浆** *M. tenellus* Bunge var. *nepalensis* (Benth.) Tsoong
 6. 花萼宽钟状,萼口稍斜,萼齿有时长短不齐,后方的1枚较大;茎直立,有翅或无翅。
 8. 茎无翅;叶脉羽状(云南、四川)……………**高大沟酸浆** *M. tenellus* Bunge var. *procerus* (Grant) Hand.-Mazz.
 8. 茎有翅;叶脉掌状(四川、云南)……………**南红藤** *M. tenellus* Bunge var. *platyphyllus* (Fr.) Tsoong

1. 小苞沟酸浆

Mimulus bracteosa Tsoong, 植物分类学报 3: 415. 1955.

小苞沟酸浆(原变型)