

米,顶端急尖,基部截形,边缘具明显的疏锯齿,羽状脉,叶柄细长,与叶片等长或较短,偶被柔毛。花单生叶腋,花梗与叶柄近等长,明显的较叶短;花萼圆筒形,长约5毫米,果期肿胀成囊泡状,增大近一倍,沿肋偶被绒毛,或有时稍具窄翅,萼口平截,萼齿5,细小,刺状;花冠较萼长一倍半,漏斗状,黄色,喉部有红色斑点;唇短,端圆形,竖直,沿喉部被密的髯毛。雄蕊同花柱无毛,内藏。蒴果椭圆形,较萼稍短;种子卵圆形,具细微的乳头状突起。 花果期6—9月。

分布于秦岭、淮河以北,陕西以东各省区。朝鲜也有。生海拔700—1200米的水边、林下湿地。可食,作酸菜用。

尼泊尔沟酸浆(变种)

var. *nepalensis* (Benth.) Tsoong, comb. nov.——*M. nepalensis* Benth. Scroph. Ind. 29. 1835.——*M. tenellus* Bunge subsp. *nepalensis* (Benth.) Hong, 中国高等植物图鉴 4: 13. 1975.

这一变种与前一变种之别,在于其植株较大,近直立;花梗与叶近等长;花萼较大,长1厘米或更长。

分布于秦岭淮河以南,广西、福建以外各省区;尼泊尔,印度同日本也有。生于海拔800—2200米的水边、湿地。

高大沟酸浆(变种)

var. *procerus* (Grant) Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 832. 1936.——*M. nepalensis* Benth. var. *procerus* Grant, Ann. Miss. Bot. Gard. 15: 207. pl. 3. f. 2. 1924.——*M. tenellus* Bunge subsp. *nepalensis* (Benth.) Hong var. *procerus* (Grant) Hong, 中国高等植物图鉴 4: 14. 1975.

与前二变种之别,为植株较高大,茎简单,直立,高20—35厘米,无翅;花冠大,长达3厘米;花萼宽钟状,口部有时稍斜,萼齿后方的一枚有时较大。

分布于云南、四川。尼泊尔,锡金也有。生于海拔200—3800米的林下、沟边。

南红藤 宽叶沟酸浆

var. *platyphyllus* (Fr.) Tsoong, comb. nov.——*M. nepalensis* Benth. var. *platyphyllus* Fr., Pl. David. 2: 103. 1888.——*M. nepalensis* Benth. var. *maior* H. Winkl. Rep. sp. nov. Beih. 12: 480. 1922.——*M. tenellus* Bunge var. *maior* (H. Winkl.) Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 833. 1936.

这一变种与高大变种的区别,在于其叶脉为掌状,叶较宽大,质地较厚;基部宽楔形全缘,中部以上具粗锯齿。